

XII. — OPILIONIDEN AUS JAVA
VON DR. C. FR. ROEWER.

Eine kleine Anzahl aus Java stammender Opilioniden, gesammelt von Herrn Edw. Jacobson und jetzt Eigentum des Leydener Museums, gehören sämtlich zur:

Subord. PALPATOIRES, Fam. PHALANGIIDAE, Subfam. Gagrellinae und sind alle auch schon von anderen Orten dieser Insel bekannt geworden. Es sind:

1. *Gagrella vulcanica* (Doleschall).

Lit.: Roewer 1923, Die Weberknechte der Erde, p. 976.

Gefunden: Gunung Gedeh 1500 meter, 18 Stück — ♂, ♀ — (Coll. No. 1454).

Bisher bekannt von: Tjibodas (Gunung Gedeh).

2. *Eugagrella variegata* (Doleschall).

Lit.: Roewer 1923, Die Weberknechte der Erde, p. 1023.

Gefunden: Gunung Gedeh 1200 meter, 1 Stück — ♂ — (Coll. No. 1452).

Gunung Gedeh 1700 meter, 1 Stück — ♀ — (Coll. No. 1453).

Gunung Gedeh 1500 meter, 12 Stück — ♂, ♀ — (Coll. No. 1454).

Bisher bekannt von: Tjibodas (Gunung Gedeh) und Gunung Salak.

3. *Zaleptus piceus* Roewer.

Lit.: Roewer 1923, Die Weberknechte der Erde, p. 1042.

Gefunden: Gunung Gedeh, 1 Stück — ♂ — (Coll. No. 1454).

Bisher nur von ebengenanntem Fundort bekannt.

Ferner liegt noch ein junges, daher nicht bestimmtes Stück des Genus *Dentobunus* Roewer vor von ebengenanntem Ort: (Coll. No. 1454).

Bremen, Januar 1923.

N.B. In die Opilioniden-Arbeiten von Prof. Dr. C. FR. ROEWER sind die beiden Klichés der Figuren N^o. 4 der Opilioniden aus Sumatra (Deel VIII, p. 136) und N^o. 1 der Simalur-Opiliones (Deel VIII, p. 147) versehentlich verwechselt worden.