

# M O M O T U S

PAR

II. SCHLEGEL.

Juillet 1863.

Point de différence sensible dans les teintes du plumage suivant le sexe ou l'âge. Côtés de la tête pourvus d'une raie noire souvent bordée de bleu et s'étendant depuis la base de la mandibule supérieure jusqu'à la fin de la région des oreilles, dont les plumes terminales sont ordinairement allongées. Au bas de la gorge le plus souvent une touffe composée de quelques plumes allongées et noires. Bords des mandibules lisses dans les très jeunes individus, mais munis ensuite de dentelures, larges dans beaucoup d'espèces et augmentant plus ou moins en étendue avec l'âge; fines dans d'autres. Queue le plus souvent étagée, composée de 6 paires de pennes, dont la paire externe est, dans plusieurs espèces, sujette à tomber, ainsi que cela a assez généralement lieu dans les pics; tandis que la paire mitoyenne dépasse souvent considérablement les autres, offrant alors, presque constamment, les barbes de sa partie libre usées à l'exception de celles de son extrémité, en sorte que le dernier tiers de ces plumes présente une forme spatulaire. Ces oiseaux habitent l'Amérique chaude. Ils nichent

dans des trous d'arbre ou dans les terriers des tatous, et pondent des œufs blancs. Le nombre des espèces connues n'est pas considérable. Leur division en groupes adoptée par les naturalistes nous ayant paru reposer sur des caractères aucunement essentiels, nous en proposons une autre.

I. Bec comprimé, à dentelures des bords des mandibules larges.

A. Dessus de la tête d'un bleu interrompu, au centre, à l'exception du *Momotus coeruleiceps*, par une large tache d'une teinte noire. Dans toutes les espèces de cette subdivision le noir des côtés de la tête est bordé de bleu, et finit en angle aigu par suite de l'allongement des dernières plumes de la région des oreilles; elles offrent encore toutes, au bas de la gorge, un flocon composé de plusieurs plumes allongées, noires et le plus souvent bordées de bleu.

**MOMOTUS BRASILIENSIS**, Latham. — Momot du Brésil, Buffon, Enl. 570. — *Rhamphastus momota*, Linné. — *Prionites momota*, Bonaparte, Consp., I, p. 165.

Reconnaissable à une large tache nuchale d'un roux rougeâtre terne. Une tache noire assez large au milieu du sommet de la tête. Occiput d'un bleu de cobalt, s'étendant au dessus des yeux sur le front, en passant successivement au bleu d'aigue-marin. Parties inférieures d'un roux verdâtre, qui s'étend également sur les côtés et le dessus du cou, où il passe, par degrés, au vert qui occupe le dos, les ailes et la queue, mais qui tire, à son tour sur le bleu dans la deuxième moitié des plumes caudales. Aile 5 pouces 4 lignes. Queue 10 (lignes.) Bec, depuis le front, 17 lignes.

Observé dans les Guyanes jusque sur les bords du Maranon.

1. 2. Adultes, Guyane. — 3. Indiv. au plumage parfait mais probablement de la première année, ayant les dentelures du bec plus fines que d'ordinaire; Surinam, présenté par la Soc.

Roy. de Zool. d'Amsterdam, 1860. — 4. Très jeune individu, à teintes parfaitement semblables à celles des adultes, mais à bec sans dentelures; aile 4 pouces 10 lignes, queue 2 pouces 10 lignes, bec 11 lignes: même origine que le N<sup>o</sup>. 3.

**MOMOTUS MICROSTEPHANUS**, Sclater, Proc. Zool. Soc. Lond., 1855, p. 135 et 1857, p. 251.

En tout point semblable au *Momotus brasiliensis*, qu'il paraît remplacer dans la Nouvelle Grenade, mais sans tache rousse à la nuque et d'une taille tant soit peu moins forte. Aile 4 pouces 9 lignes. Queue 7 pouces 9 lignes. Bec 14 lignes.

1. Adulte, Nouvelle Grenade.

**MOMOTUS BAHAMENSIS**, G. R. Gray. — *Prionites bahamensis*, Swainson; Bonaparte, Consp., I, p. 165.

Absolument semblable au *Momotus microstephanus*; mais la couleur des parties inférieures d'un roux jaunâtre et tirant fort peu au vert; le bleu d'aigue-marin se prolongeant le long des sourcils jusque sur les côtés de l'occiput, et le bleu de cobalt de l'occiput assez restreint. — Aile 5 pouces. Queue 8 pouces 4 lignes. Bec 15 lignes.

Observé à Tabago et à la Trinidad.

1. Adulte, Trinidad.

**MOMOTUS SUBRUFESCENS**, Sclater, Revue et Mag. de Zool., 1853, p. 489; Proc., l. c., 1857, p. 252.

Très semblable au *Momotus bahamensis*; mais il est d'une taille moins forte, le dos et les scapulaires sont lavés d'un roux jaunâtre semblable à celui des parties inférieures, et le bleu d'aigue-marin du front est moins pur et lavé de roussâtre. Aile 4 pouces 4 lignes. Queue 7 pouc. 10 lign. Bec 15 lign.

Observé à Santa Martha et à Cartagena.

1, 2 et 5. Adultes, Cartagena. — 4. Jeune femelle, Guatemala, par Mr. Verreaux, 1865.

**MOMOTUS LESSONI**, Lesson, *Revue Zool.*, 1842, p. 174; Des Murs, *Iconogr.*, pl. 62. — *Prionites Lessonii*, Bonaparte, *Consp.*, I, p. 253.

Bleu de l'occiput assez restreint et séparé de la nuque par une bande noire. Teinte verte des parties supérieures tirant fortement au bleu sur les ailes et la queue. Le vert roussâtre des parties inférieures et du cou passe, sur la gorge, au vert bleuâtre. Aile 5 pouces 5 lignes. Queue 8 pouces 5 lignes. Bec 17 lignes.

Observé au Mexique.

1. Adulte, Mexique, obtenu du Musée de Paris en 1858. —
2. Femelle adulte, Guatemala, par Mr. Verreaux, 1865.

**MOMOTUS COERULEICEPS**, Gould, *Proc. Zool. Soc.*, 1836, p. 18. — *Prionites coeruleiceps*, Bonaparte, *Consp.*, I, p. 165.

Reconnaissable au manque de la tache noire du sommet de la tête; le dessus de cette partie étant teint d'un bleu verdâtre sale ou tirant au noirâtre, passant au roux verdâtre sur le devant du front, et au bleu assez clair sur les sourcils et les bords de l'occiput qui sont, en outre, entourés d'une bande noire. Le roux verdâtre du cou et des parties inférieures passe, sur la gorge, au verdâtre pur. Aile 5 pouces 3 lignes. Queue 8 pouces 7 lignes. Bec 16 lignes.

Observé au Mexique.

1. Adulte, Mexique, obtenu du Musée de Paris en 1835. —
2. Jeune de l'année, Mexique.

B. Dessus de la tête d'un roux se répandant en outre, souvent, sur d'autres parties du plumage.

**MOMOTUS MARTIL**. — *Prionites Martii*, Spix, *Aves Bras.*, p. 64, pl. 60. — *Crypticus Martii*, Bonaparte, *Conspectus*, I, p. 165. — *Momotus platyrhynchus*, Leadbeater, *Trans. Linn. Soc.*, XVI, p. 92. — *Prionirhynchus platyrhynchus*, Selater, *Proc. l. c.*, 1857, p. 256.

Freins, joues, région des oreilles et flocon de la gorge d'un noir profond. Toutes les autres parties de la tête, le cou, la moitié antérieure du manteau et les parties inférieures jusqu'au ventre d'un roux rouge, plus clair et tirant au jaunâtre à la gorge et sur les côtés du cou. Ventre, dos, ailes et face supérieure de la queue, d'un vert tirant au bleu sur la queue, le milieu de l'abdomen et sur les bords externes des grandes rémiges.

Observé sur les bords du Maranon.

1. Adulte, acquis de Mr. Frank en 1860 comme provenant de Quito; aile 5 pouces 6 lignes, queue 9 pouces 3 lignes, bec 18 lignes; cet individu n'offre que 5 paires de plumes caudales, et la paire moyenne est en spatule, étant usée en avant de son extrémité, comme cela a ordinairement lieu dans les motmots.

**MOMOTUS SEMIRUFUS**, Scater, Rev. Zool., 1855, p. 489; Proc. Zool. Soc. Lond., 1857, p. 254.

Très voisin du *Momotus Martii*, mais il est d'une taille un peu plus forte, la teinte rousse est plus claire et s'étend plus en arrière, occupant toute la moitié antérieure du ventre; le vert du dos, des ailes et de la première moitié de la queue et du bas-ventre tire plus ou moins fortement au roux jaunâtre; le bleu des barbes externes des six premières rémiges est plus foncé, et le bec est plus comprimé. Aile 5 pouces 9 lignes. Queue 8 pouces 4 lignes. Bec 17 lignes. Notez que nos deux individus n'ont que 5 paires de plumes à la queue, et que la paire moyenne n'est pas en spatule.

Observé à la Nouvelle Grenade et à Ecuador.

1 et 2. Adultes, Bogota.

**MOMOTUS RUFICAPILLUS**, G. R. Gray. — *Prionites ruficapillus*, Illiger, Mus. Berol., in Lichtenstein, Verzeichniss, 1825, p. 21, N°. 206. — *Baryphonus ruficapillus*, Vieillot. — Le Tutu d'Azara, que personne n'a retrouvé jusqu'à ce jour, ne paraissant pas différer du *Momotus ruficapillus*, on peut

joindre aux synonymes de *Momotus ruficapillus* ceux de *Baryphonus cyanogaster*, Vieillot, et probablement aussi le *Momotus Le Vaillantii* de Lesson.

Teinte générale verte tirant au bleuâtre sur le ventre, au bleu sur les bords externes des grandes rémiges et sur la partie libre des plumes mitoyennes de la queue, passant au roussâtre terne sur la gorge, interrompue sur la poitrine par une bande transversale très large et d'un roux rougeâtre clair, et remplacée sur le sommet de la tête et l'occiput par une teinte d'un roux rouge. Aile 5 pouc. 6 lign. Queue 8 p. 4 l. Bec 17 l. Notez que nos individus n'ont que 5 paires de plumes à la queue et que la paire mitoyenne n'est pas en spatule.

Observé dans le Brésil méridional, dans les parties voisines du Paraguay et dans les parties orientales du Pérou.

1 et 2. Adultes, Brésil. — 3. Adulte, Pérou.

**MOMOTUS MEXICANUS**, Swainson, Phil. Mag., 1827, p. 442; Zool. Ill., pl. 81.

Taille moyenne. Teintes en général ternes. La teinte rousse est claire et bornée sur le dessus de la tête. Raie noire des côtés de la tête bordée de bleu, étroite, mais longue par suite des plumes allongées de la région des oreilles. Dessus d'un vert terne passablement clair, tirant au bleu sur la queue et les rémiges, au roux-jaunâtre sur la nuque. Dessous d'un vert-bleu blanchâtre, passant au blanchâtre sur le ventre. Queue composée de 12 plumes; les mitoyennes en spatule. Aile 4 pouc. 2 lignes. Queue 5 pouc. 9 lign. Bec 15 lignes.

Observé dans les parties méridionales du Mexique.

1. Adulte, Mexique.

II. Bec déprimé, à dentelures des bords des mandibules assez fines. Taille moyenne ou petite. Les individus que l'on a pu examiner des espèces de cette subdivision n'ont offert que 5 paires de plumes caudales. Elle répond, en partie, au genre *Hylomanes* de Lichtenstein.

**MOMOTUS SUPERCILIARIS**, G. R. Gray. — *Prionites superciliaris*, Jardin et Selby. — *Eumomota superciliaris*, Sclater, Proc., 1857, p. 257.

Très reconnaissable à la large raie surciliaire d'un bleu-blanc argenté, s'étendant de chaque côté depuis le front jusqu'à l'occiput, ainsi qu'à la tache noire, bordée latéralement de bleu-blanc, commençant en pointe au menton et s'étendant, en s'élargissant, jusque sur le jabot. Manteau, poitrine et ventre d'un roux rougeâtre terne et peu foncé. Pennes de la queue et des ailes d'un bleu verdâtre, mais terminées de noir. Les autres parties vertes. Bec pourvu, en dessus, d'une carène. Aile 4 pouces 1 ligne. Queue 7 pouc. 10 lign. Bec 15 lignes.

Observé dans l'Amérique centrale et dans les contrées avoisinantes.

1. Adulte, Baie de Campêche; pennes moyennes de la queue en spatules très larges et à tiges longues.

**MOMOTUS GULARIS**, G. R. Gray. — *Prionites gularis*, Lafresnaye. — *Hylomanes gularis*, Sclater, Proc., 1857, p. 257.

Taille moyenne. Teintes simples. Freins et régions de l'œil d'un roux clair, au lieu de noir, teinte qui ne forme qu'une raie étroite occupant le milieu de la région des oreilles. Gorge d'un bleu très clair. Souscaudales et milieu du bas-ventre d'un roux clair. Les autres parties d'un vert passant au bleu sur la partie libre des pennes moyennes de la queue. Aile 3 pouces 7 lignes. Queue 5 pouc. 1 ligne. Bec 12 lignes.

Observé à Guatémala.

1. Adulte, pennes de la queue ordinaires; acquis en 1861 de Mr. Frank comme provenant de Quito.

**MOMOTUS MOMOTULA**, G. R. Gray. — *Hylomanes momotula*, Lichtenstein.

Reconnaissable à sa petite taille, sa queue courte, le manque de plumes allongées et noires au bas de la gorge, et par sa tache oculaire noire en dessous largement bordée de blanc,

teinte qui se répand également sur les flancs, et borde de chaque côté la gorge. Dessus de la tête jusqu'à la nuque roux. Une raie d'un bleu verdâtre au dessus de l'oeil. Les autres parties supérieures vertes; les parties inférieures d'un vert pâle, passant au blanchâtre sur le milieu de l'abdomen. Rémiges en grande partie brunes. Aile 2 pouces 9 lignes. Queue 2 pouces 3 lignes. Bec 10 lignes.

Observé au Mexique.

1. Adulte, Mexique, voyage de Deppe: un des types de l'espèce, obtenu du Musée de Berlin. — 2. Mâle, Mexique, par Mr. Verreaux, 1865.

III. Bec à dentelures excessivement fines, très déprimé. Taille fort petite. Queue courte, carrée.

#### TODUS MULTICOLOR, Gould.

1. Mâle, Cuba. — 2. Femelle, Trinité. — 3. Mâle, Haïti, présenté par Mr. Ricord.

#### TODUS SUBULATUS, Gould.

1. Adulte, St. Domingo.

### R É S U M É.

		montés.	montées.
Momotus	brasiliensis.	p. 2.	4
"	microstephanus.	" 3.	1
"	bahamensis.	" 3.	1
"	subrufescens.	" 3.	4
"	Lessoni.	" 4.	2
"	coeruleiceps.	" 4.	2
"	Martii.	" 4.	1
"	semirufus.	" 5.	2
"	ruficapillus.	" 5.	2
"	mexicanus.	" 6.	1
"	superciliaris.	" 7.	1
"	gularis.	" 7.	1
"	momotula.	" 7.	2
Todus	multicolor.	" 8.	3
"	subulatus.	" 8.	1

Total . . . 28.