

# P O L Y B O R I

PAR

H. SCHLEGEL.

Novembre 1862.

Les *Çaraçaras*. Oiseaux de l'Amérique voisins des Buses, mais se rapprochant des vautours par leur manière de vivre. Leur bec est plus ou moins allongé, peu courbé et à bords droits. Leur face est presque toujours plus ou moins nue. Ils ont les tarsi plus ou moins allongés, emplumés seulement dans le premier quart de leur longueur, et revêtus le plus souvent, par devant et par derrière, de trois à quatre plaques, suivis vers le haut de plusieurs rangées de plaques plus petites. Leurs ongles sont vigoureux, mais pas très fortement crochus. Ils sont répandus depuis la Floride jusqu'aux îles Falkland, et se nourrissent de la chair des animaux morts ou blessés, de reptiles, d'insectes ou de leurs larves et de limaçons.

**POLYBORUS.** Tarsi allongés. Ongles forts, mais médiocrement courbés. Ailes assez longues, aboutissant près de l'extrémité de la queue, qui est de moyenne longueur et un peu arrondie à l'extrémité. — Ils habitent de préférence les lieux

découverts, marchent et courent même avec grande facilité à terre, suivent les voyageurs et les troupeaux, se nourrissent le plus souvent de la chair d'animaux blessés ou morts, aiment à fréquenter les villes et villages pour avaler des immondices : en un mot, ils se rapprochent par leurs habitudes plus ou moins complètement des oiseaux-vautours.

A. Espèces se rapprochant, par leur taille, de la Buse commune.

**POLYBORUS BRASILIENSIS**, Swains., Zool. Illustr., pl. 2. — *Falco brasiliensis*, Gmelin. — *Polyborus vulgaris*, Vieillot, Gal. pl. 7. — Çaraçara au Brésil.

Longueur totale 19 à 20 pouces. Aile 14 à 15 pouces. Queue 8 pouces. Tarse 5 pouces 4 lignes. — Narines en fente. Face nue jusqu'au front et derrière l'oeil. Plumes du dessus de la tête et de l'occiput assez larges et allongées. Bec bleuâtre. Cire, freins et tour de l'oeil d'un rouge de brique pâle. Serres d'un jaune d'ocre pâle. Iris brun. Plumage de l'adulte : sommet de la tête, ailes, tiers postérieur de la queue, dos, ventre et plumes des jambes d'un brun noirâtre tirant au rougeâtre ; les deux tiers antérieurs des pennes de la queue blanchâtres, avec de nombreuses bandes transversales très étroites et d'un brun foncé ; couvertures de la queue, côtés de la tête et gorge blanches ; les autres parties de la tête, le cou et la poitrine blanchâtres, avec des bandes transversales d'un brun foncé. Jeune : plus pâle avec des taches longitudinales, au lieu de transversales, sur le cou et la poitrine.

Patrie : les Guyanes, la Mexique, la Floride, les Antilles ; très commun au Brésil et dans les savannes du Rio de La Plata ; habite toute la Patagonie jusqu'au Cap Hoorn et les côtes arides et rocheuses de l'Océan pacifique. On le rencontre même dans les forêts de la Terre de feu. Il suit les voyageurs et tue les animaux blessés. Il est rare au Pérou, et ne quitte que rarement la région des forêts, dont il habite la lisière ;

mais il aime le séjour des plantations. — Cet oiseau se tient de préférence dans les plaines. Il a l'habitude d'ériger, au vol, les plumes de la tête; c'est aussi alors qu'il fait entendre sa voix. Il est toujours en mouvement, soit qu'il marche à terre, soit qu'il vole d'un buisson à l'autre. Il se nourrit de rats, de reptiles, de jeunes oiseaux, d'insectes, de limaçons et poursuit les oiseaux de proie pour leur enlever les oiseaux qu'il viennent de prendre; souvent même il oblige les cathartes de dégorger la charogne qu'ils ont avalée. Il niche sur les arbres ou les broussailles; sa ponte est de deux oeufs, d'un brun-roux clair taché de brun ou de rouge, particulièrement vers le gros bout (Neuwied, Azara, Darwin et Tschudi). — On ne le trouve jamais dans les forêts ni près des côtes maritimes. Il ne fait jamais la chasse aux oiseaux (Schomburgk, 741).

1. Femelle au plumage parfait, Brésil, acquis en 1835 à Paris. — 2. Femelle au plumage parfait, Surinam, présenté par la Société zoologique d'Amsterdam, 1861. — 3. Femelle au plumage parfait, Brésil, voyage de Natterer. — 4. Mâle dans la livrée de passage, Costa Rica, du Musée de Berlin, 1862. — 5. Femelle au premier plumage, Brésil, voyage de Beske. — 6. Mâle au premier plumage, Brésil.

**POLYBORUS AUSTRALIS.** — *Falco australis*, Gmelin. — *Falco novae Zeelandiae*, Temm., Pl. col. 192 et 244; Jard. et Selby, Illustr., pl. 24. — *Milvago leucurus*, J. E. Gray, Beagle, p. 25. — *Milvago australis*, G. R. Gray.

Reconnaissable aux plumes de la tête très étroites et en guise de soies sur le front. Face nue comme dans le *Polyborus brasiliensis*. Narines orbiculaires. Aile 15 pouces. Queue 9 pouces. Tarse 3 pouces. Doigt du milieu 2 pouces; ongle de ce doigt 11 lignes. Tarses revêtus par devant, vers le bas, de 4 à 6 larges plaques. — Cire et pieds d'un jaune vif. Plumage des adultes d'un beau noir à reflets d'un brun pourpre; queue terminée de blanc; plumes du manteau, du jabot et de

la poitrine à taches étroites blanches le long de leurs tiges; et tirant au roux sur la nuque, le cou et la poitrine. Parait habiter exclusivement les îles Malouines, et les îlots voisins. Ressemble beaucoup, par ses habitudes et sa manière de vivre, au Çaraçara ordinaire. Se nourrit de la chair des animaux morts, d'immondices, de voiries. Attaque des animaux blessés. Fait en compagnie la chasse aux lapins. Court à terre avec une grande vitesse. Quoique peu farouche, il choisit constamment, pour y construire son aire, les rochers isolés situés le long de la côte de la mer.

1. Mâle au plumage parfait, île orientale de Falkland, voyage du Capitaine Abbot, obtenu en 1860. — 2. Individu au plumage parfait, îles Falkland, voyage de la Coquille. — 3. Individu au premier plumage, îles Falkland, par Mr. Frank.

**POLYBORUS MEGALOPTERUS.** — *Aquila megalopterus*, Meyen, Nova Act., 1834, pl. 8. — *Phalcoboenus montanus*, Lafresn. et Orb. dans Orb., voyage, pl. 2. — *Milvago albigularis*, Gould, Beagle, pl. 1?

Reconnaissable aux plumes du sommet de la tête laineuses et comme crépues. Face nue et formant une espèce de calotte. Aile 13 pouces 6 lignes à 15 pouces. Queue 8 à 9 pouces, et arrondie. Tarse 31 à 38 lignes. Doigt du milieu 18 à 20 lignes. Ailes aboutissant près de l'extrémité de la queue. Yeux très petits. Narines orbiculaires, rapprochées du sommet de la cire. Bec et ongles jaunâtres, mais bleus vers la base. Pieds jaune orangé pâle. Peau des freins et cire d'un jaune rouge vif. Iris jaune brunâtre. Teinte générale du plumage d'un noir à reflets d'un brun pourpre, remplacé sur le ventre, les plumes des jambes et les couvertures de la queue, par un blanc plus ou moins pur. Les penes de la queue également blanches, offrent au milieu, une très large bande foncée. Livrée de passage: d'un noir-brun en dessus; en dessous d'un blanc relevé sur les flancs par des taches longitudinales noires. Très jeune: d'un brun roux, plus clair sur le bord des plu-

mes et à baguettes noires. Croupion blanchâtre; queue avec une bande claire près de son extrémité; pieds verdâtres.

Habite le Chilé et le Pérou. Ne se trouve que sur les hautes montagnes, jamais dans la région des forêts ou sur les côtes de la mer. Il est, dans ces lieux là, avec le condor, l'oiseau de proie le plus commun. Il est peu farouche, et toujours en mouvement, soit qu'il cherche des reptiles ou des vers entre les rochers, soit qu'il s'abat sur des cadavres d'animaux. Il entre en amour au mois de Février et dépose trois oeufs sur les rochers nus. Son cri est très désagréable.

1. Adulte, Patagonie.

B. Espèces de la taille de l'Épervier femelle. Freins et région des yeux nus. Narines orbiculaires.

**POLYBORUS CHIMACHIMA**, Vieillot, N. Dict. 5, p. 259: — *Milvago ochrocephalus* et *Gymnops strigilatus*, Spix, Aves brasil., pl. 5 et 4. — *Falco degener*, Illiger.

Aile 11 pouces. Queue 6 pouces et 3 à 6 lignes. Tarse 2 pouces. Doigt du milieu 17 lignes. Iris d'un brun gris. Bec d'un blanc bleuâtre. Cîre, freins et tour de l'oeil jaune d'orange. Pieds d'un bleuâtre pâle. Ongles d'un brun grisâtre. — Plumage d'un jaune d'ocre clair et sale. Une raie brune derrière l'oeil. Ailes d'un brun foncé passant, sur la moitié antérieure des grandes rémiges, au blanc jaunâtre, interrompu par de fines raies brunes en zig-zag. Queue portant huit bandes foncées, suivies d'une large bande d'un brun noir, laquelle occupe à elle seule le dernier tiers de la queue. Les jeunes ont toute la queue ornée de bandes étroites, et le petit plumage offre de grandes taches longitudinales brunâtres. — Un individu du Musée de Bruxelles est d'un noir brunâtre, plus clair sur les parties inférieures, dont les plumes sont bordées de gris-brun; la première moitié de sa queue offre sept bandes claires.

Commun à la Guyane, au Brésil et au Paraguay. — Habite

de préférence les lieux découverts. Vit seul ou par couples, se rapproche souvent des habitations, et est peu farouche. Il se nourrit d'insectes et particulièrement de leurs larves, qu'il va souvent chercher sur le dos du bétail. Il se pose souvent à terre ou parcourt les contrées marécageuses à la recherche de limaçons ou de reptiles. Il fait de temps en temps entendre sa voix, dont le son ressemble à un sifflement aigu. Niche sur des arbres. S'élève rarement dans les airs (Azara, Neuwied etc.). Ne se trouve que dans les savannes, où on le voit ordinairement marcher dans les lieux marécageux. Se nourrit de reptiles, d'insectes et de mollusques (Schomburgk, 741).

1. Mâle au plumage parfait, Brésil, par Mr. Verreaux. —
2. Femelle, à peu près au plumage parfait, Brésil, voyage de Natterer. —
3. Individu au premier plumage, Brésil, voyage de Natterer. —
4. Femelle au premier plumage, Surinam. —
5. Mâle au premier plumage, Brésil.

**POLYBORUS CHIMANGO**, Vieillot, N. Dict., 5, p. 250. — *Aquila pezoporos*, Meyen, Nova Acta, 1834, pl. 16. — *Milvago chimango*, Gray, Gen. of Birds, pl. 5.

Très semblable au *Polyborus chimachima*, mais à tarse un peu plus élevés et à teintes un peu diverses. Ailes plus claires, queue onnée de grisâtre. Iris brun. Tête et dessous de l'oiseau d'un jaune brunâtre tirant au grisâtre; toutes les plumes avec des taches foncées aux baguettes et des bandes claires peu distinctes. Longueur du tarse 2 pouces 3 lignes.

Commun sur les bords du Rio de la Plata, et au Chili. On dit qu'il niche dans les fourmilières et que ses oeufs sont d'un blanc bigarré de brun (Azara). Suivant d'Orbigny, ses oeufs sont assez arrondis, d'un blanc jaunâtre, avec des taches brunes, claires et foncées. Remplace le *chimachima* dans la partie australe de l'Amérique, où il est répandu depuis le Chili et le Paraguay jusque dans la Terre de feu.

1. Individu au plumage parfait, Chili. — 2. Individu dans la livrée de passage, Paraguay. — 5. Individu dans la livrée de passage, Chili, par Mr. Frank, 1862.

**IBICTER.** Ce petit groupe comprend quelques espèces qui se rattachent naturellement aux précédentes, quoiqu'elles soient assez différentes les unes des autres par plusieurs détails de leurs formes, et dont presque chacune présente, pour ainsi dire, un type particulier. Elles paraissent préférer le séjour des bois à celui des plaines, et se nourrir plus exclusivement d'insectes et de limaçons. Leur patrie est bornée aux régions chaudes de l'Amérique du Sud.

**IBICTER ATER**, Swainson. — *Daptrius ater*, Vieillot.  
*Falco aterrimus*, Temm., Pl. col. 542.

Face nue jusque vers la fin du front, la région des oreilles et celle du menton. Longueur totale 14 à 15 pouces. Aile 11 pouces. Queue 6 pouces et demi. Tarse 1 pouce 11 lignes. Doigt du milieu 1 pouce 5 lignes; ongle de ce doigt 7 lignes. Hauteur de la mandibule supérieure 5 lignes. — Ongles peu longs. Narines orbiculaires, rapprochées des bords antérieur et supérieur de la cire. Ailes recouvrant trois quarts de la queue. D'un noir profond remplacé, à la base de la queue, par une large bande blanche. Dans les jeunes, le blanc occupe les deux premiers tiers de la queue et il est interrompu par six bandes noires.

Originaire de la Guyane. — Il habite les oasis de la Savanne, niche sur des arbres, et fait la chasse aux reptiles. Il est du nombre de ces oiseaux de proie qui se rendent, à cet effet, dans les lieux des Savannes où on a mis le feu aux herbes.

1. Individu au plumage parfait, Surinam. — 2. Individu ayant le blanc de la queue avec des bandes noires: Cayenne.

**IBICTER SOCIABILIS.** — *Rosthramus sociabilis*, d'Orb. et

Lafr. — *Herpetotheres sociabilis*, Vieillot. — *Falco hamatus*, Illiger; Temm., Pl. col. 61 et 251.

Très remarquable par son bec extrêmement grêle et allongé. Aile 10 pouces et demi à 11 pouces; pointe de l'aile 2 à 3 pouces. Queue 4 pouces et demi. Tarse un pouce 8 lignes. Doigt du milieu un pouce 5 lignes; ongle de ce doigt 9 lignes. Hauteur de la mandibule supérieure 3 lignes. Tarses emplumés, par devant, dans le premier tiers de leur longueur; revêtus du reste par de grandes plaques transversales. Côtés de la tête nues jusque derrière l'oeil. Adulte: serres, cire, freins, angle de la bouche et partie nue de la mandibule inférieure d'un jaune d'orange intense; iris rouge de sang; plumage couleur de schiste uniforme.

Originaire du Brésil et de la Guyane. Habite les petits bois proches des plaines. Se nourrit d'insectes et de limaçons (Neuwied). On ne le trouve que sur les lisières des bois, où il aime à se percher sur les arbres, afin de guetter sa proie en plongeant ses regards dans la Savanne. Son vol est gracieux et léger. Il se nourrit de reptiles et d'oiseaux (Schomb., 736).

1. Mâle au plumage parfait, Brésil. — 2. Femelle au plumage parfait, Surinam; présenté par Mr. de Mirandolle.

**IBIGTER LEUCOPYGUS.** — *Falco leucopygus*, Spix, Aves Brasil., pl. 2.

Semblable au *sociabilis*, mais d'une taille plus forte, à ailes et queue plus longues; à teintes tirant moins sur le gris bleuâtre et avec les couvertures inférieures de la queue, l'extrémité et le premier tiers des pennes caudales d'un blanc plus ou moins pur. — Aile 13 pouces; pointe de l'aile 4 pouces. Queue 6 pouces 3 lignes à 6 pouces et demi. Tarse 2 pouces. Ongles très effilés.

Observé au Brésil.

1. Individu au plumage parfait, Brésil, voyage de Spix. —  
2. Individu au premier plumage, Brésil, voyage de Spix: teinte générale tirant au brun, plumes bordées de roux.

**IBICTER AMERICANUS.** — *Falco americanus*, Boddaert, Pl. enl. 416. — *Falco aquilinus*, Gmelin. — *Falco nudicollis*, Daudin. — *Falco formosus*, Latham. — *Ibicter leucogaster*, Vieillot, Gal. 16.

Reconnaissable à ses ailes ne recouvrant qu'un peu plus de la moitié de la queue qui est assez longue, et à la peau nue de la face s'étendant non seulement depuis la cire jusque derrière l'œil, mais aussi sur la gorge. Cire courte. Bec allongé. Aile 12 pouces à 15 pouces 6 lignes; pointe de l'aile 3 pouces 3 lignes à 4 pouces 6 lignes. Queue 8 pouces à 10 pouces et demi. Hauteur de la mandibule supérieure 5 lignes; longueur 13 lignes. D'un noir profond; plumes des jambes, bas-ventre et couvertures inférieures de la queue d'un blanc pur. Adulte: iris d'un rouge éclatant; cire, angle de la bouche et base de la mandibule inférieure d'un bleu de ciel pur et clair; paupière inférieure jaunâtre, bordée de rouge; parties nues de la face d'un rouge vermillon; bec jaune-verdâtre clair; serres d'un jaune d'orange vif.

Observé à la Guyane et au Brésil. Habite les forêts. Voltige d'une branche à l'autre en faisant entendre de très loin sa voix perçante et composée de plusieurs sons. Se réunit, l'époque de la propagation passée, en troupes plus ou moins nombreuses. Se nourrit d'insectes et de leurs larves, et plus particulièrement de guêpes et d'abeilles (Neuwied). Vit, par troupes, dans les forêts; se nourrit de fruits et de baies, et est très bruyant (Schomburgk, 742).

1. Mâle au plumage parfait, Surinam. — 2. Mâle au plumage parfait, Cayenne, obtenu en 1835 à Paris. — 3. Femelle au plumage parfait, Brésil. — 4. Femelle au plumage parfait, Cayenne.

## R É S U M É.

		Indiv. montés.
Polyborus brasiliensis.	p. 2.	6
" australis.	" 3.	3
" megalopterus.	" 4.	1
" chimachima.	" 5.	5
" chimango.	" 6.	3
Ibicter ater.	" 7.	2
" sociabilis.	" 8.	2
" leucopygus.	" 8.	2
" americanus.	" 9.	4
		<hr/>
Total 28 échantillons.		28