

REVUE

DE LA

COLLECTION DES ALCEDINES FAISANT PARTIE DU

MUSÉE DES PAYS-BAS.

PAR

H. SCHLEGEL.

Juin 1874.

ALCEDO.

ALCEDO GUTTATA. Alcedines, 1863, p. 1.

Ajoutez: 4. Individu du Nipaul, 1868.

ALCEDO LUGUBRIS. Voir Alcedines, 1863, p. 2.

Deux individus montés du Japon.

ALCEDO RUDIS. L. c. p. 2.

Ajoutez: 20. Mâle à double écharpe pectorale, tué le 14 Déc. 1863, Emoy en Chine, prés. par M. J. Buddingh.

ALCEDO MAXIMA. L. c. p. 3. — *Ceryle Sharpei*, Gould; Sharpe, Alced., p. 71, pl 21.

Treize individus montés.

ALCEDO TORQUATA. L. c. p. 4.

Ajoutez: 6, 7. Individus dans la livrée de passage, Surinam, 1865.

ALCEDO ALCYON. L. c. p. 4.

Ajoutez: 8. Jeune femelle, tuée le 26 Juin 1865, Wisconsin, Thure Kumlien.

ALCEDO AMAZONA. L. c. p. 5.

Ajoutez: 6. Mâle, Surinam, 1866. — 7. Mâle, Amér. tropic., 1870. — 8. Femelle, tuée en Mars, 1870, Bogotà. — 9. Femelle, St. Marthe, Nouv. Grenade, 1865.

ALCEDO AMERICANA. L. c. p. 5.

Ajoutez: 8. Mâle, Tejas, 1870. — 9. Jeune femelle, Tejas, 1870. — 10. Mâle, Surinam, prés. en 1867 par M. Bresser. — 11. Femelle, Oyapock (Cayenne), 1873.

ALCEDO CABANISII, L. c., p. 5.

Ajoutez: 5. Mâle, Mejico, 1867. — 6, 7. Femelle, Costa Rica, 1869. — 8. Jeune femelle, Costa Rica, 1869.

ALCEDO VIRIDIRUFA. L. c. p. 5. — *Alcedo inda*, Linné?

Ajoutez: 8. Mâle, Surinam, prés. en 1864 par M. de Graaf. — 9. Mâle, tué à Surinam, prés. en 1867 par M. Bresser. — 10, 11, 12. Femelles, tuées à Surinam, prés. en 1867 par M. Bresser. — 13. Mâle, Brésil, 1866. — 14, 15. Mâle et femelle, Oyapock (Cayenne), 1873.

ALCEDO SUPERCILIOSA. L. c., p. 6.

Ajoutez: 3. Mâle, Cayenne, 1863. — 4. Mâle, Guyane, 1864. — 5, 6. Mâles, tués à Surinam, prés. en 1867 par M. Bresser. — 7. Femelle, tuée à Surinam, Bresser, 1867. — 8. Mâle, Surinam, 1866. — 9. Femelle, Côte ferme, 1865.

ALCEDO ISPIDA. L. c. p. 6.

Ajoutez: 11. Mâle, tué en Janvier 1864, Noordwijk, prés. par M. Verster v. Wulverhorst. — 12. Adulte, tué le 15 Janvier 1864, Cintra au Portugal, du Musée de Lisbonne. — 13. Femelle, tuée en Oct. 1863, Cintra. — 14. Adulte, Hollande, 1874.

ALCEDO MINOR. L. c., p. 7. — *Alcedo bengalensis*, Gmelin, Sharpe, *Alced.*, p. 11, pl. 2.

Il est bon de faire rappeler que l'intensité des teintes de cette espèce présente, quelquefois, des variations sensibles, soit individuelles, soit suivant les localités.

Les individus de notre collection ont été recueillis en Nubie, sur le Continent de l'Inde, à Ceylan, Sumatra, en Chine, à Formosa, au Japon, aux Philippines, dans le groupe de Sanghir et à Timor.

Ajoutez au Catalogue de 1863.

Individus de la Chine. — 36. Femelle, tuée près de Canton, prés. en 1873 par Jonkheer H. Gevers. — 37. Adulte, tué le 16 Nov. 1862, Emoy, prés. par M. J. Buddingh. — 38, 39, 40. Mâle et deux femelles, tués en Mars 1861, Emoy, voyage de Swinhoe.

Individus de l'île de Formosa. — 41, 42. Adultes, tués en 1861 à la Côte S. Ouest, Swinhoe. — 43, 44. Adultes, tués en Avril 1862, Côte mér., Swinhoe.

Individu du Japon. — 45. Adulte, prés. en 1866 par Jonkh. Pompe van Meerdervoort.

Individus du groupe de Sanghir. — 46. Mâle, tué le 27 Oct. 1865, Siao, Hoedt. — 47, 48. Femelles, tuées le 11 Déc. 1863, Sanghir, Hoedt. — 49. Adulte, Sanghir, 1870.

ALCEDO MINOR MOLUCCENSIS. L. c. p. 8.

Je rappelle que cet oiseau ne se distingue de l'*Alcedo minor* que par le manque de roux aux freins et sur le haut de la région des oreilles. Il est toutefois bon de faire observer qu'il existe des individus où, ce roux se montre plus ou moins dis-

tingement. Il paraît que cet oiseau habite des localités différentes de celles que fréquente l'Alcedo minor.

Nos voyageurs l'ont observé à Célèbes, dans les groupes de Soula et de Halnahéra, à Bouro avec Amblaou, à Amboine, Céram et Goram.

Ajoutez :

Individus de Célèbes. — 7, 8. Mâle et femelle, tués le 1 Avril 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 9. Femelle, tuée le 27 Avril 1863, Gorontalo, v. Rosenberg. — 10. Femelle, tuée le 9 Juin 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 11. Femelle, tuée le 2 Août 1863, Gorontalo, v. Rosenberg: aux freins bordés de roux. — 12, 13. Mâle et femelle, tués le 19 Juillet 1864, Pagouat, v. Rosenberg: aux freins bordés de roux. — 14. Mâle, tué le 10 Mai 1864, Toulabello, von Rosenberg. — 15. Femelle, tuée le 23 Août 1864, Kema, von Rosenberg: freins bordés de roux. — 16, 17, 18. Individus du Célèbes septentrional, prés. en 1866 par Jonkh. R. v. Duyvenbode. — 19. Individu du Célèbes sept., prés. en 1870 par M. Riedel. — 46. Jeune femelle, Célèbes, 1865.

Individus du groupe de Soula. — 20. Mâle, tué en Février 1864, Soula-bessie, Bernstein: freins et dessus de la région des oreilles bordés de roux. — 21. Femelle, tuée le 12 Nov. 1864, Hoedt. — 22, 23. Mâles, tués le 22 Déc. 1864, Soula-Bessie, Bernstein: freins roux. — 24. Femelle, tuée le 22 Déc. 1864, Soula-Bessie: freins et dessus de la région auriculaire bordés de roux.

Individus de l'île de Bouro. — 25, 26. Mâles, Hoedt, 1863. — 27. Femelle, Hoedt, 1863. — 28. Femelle, tuée le 12 Août 1864, Hoedt.

29. Individu mâle de l'île d'Amblaou, située au Sud de Bouro, tué le 8 Févr. 1863, Hoedt.

30. Individu mâle de l'île de Halmahéra, tué le 27. Oct. 1861, Dodingo, Bernstein.

Individus du groupe d'Obi. — 31. Femelle, tuée le 21 Juillet 1862, Obi-major, Bernstein. — 32, 33, 34. Femelles,

tuées en Août 1862, Obi-lattou, Bernstein. — 35. Jeune mâle, tué le 3 Août 1862, Obi-lattou, Bernstein.

Individus d'Amboine — 36. Mâle, tué le 17 Janvier 1867, Hoedt. — 37. Mâle, tué le 29 Mars 1866, Hoedt. — 38. Mâle, tué le 2 Mars 1867, Hoedt: freins et dessus de la région auriculaire bordés de roux. — 39. Femelle, tuée le 18 Août 1864, Hoedt. — 40, 41. Femelles, tuées en Nov. 1866, Hoedt: un peu de roux aux freins et à la région auriculaire. — 42, 43. Mâle et femelle, Hoedt, 1865. — 44. Femelle, Hoedt, 1865; avec un peu de roux aux freins et à la région des oreilles.

Individu de l'île de Goram, à l'Est de Céram. — 45. Femelle, tuée le 27 Avril 1865, von Rosenberg.

ALCEDO MENINTING. L. c. p. 9. — *Alcedo asiatica*, Swainson. Observé à Java, Bangka, Bornéo et Célèbes.

Ajoutez: 13. Individu aux joues rousses, Java, Diard, 1864. — 14. Individu aux joues bleues, Java, 1870. — 15. Mâle, tué le 27 Oct. 1866, Pleyharie, Bornéo mér., prés. par M. Semmelink. — 16. Adulte, Bornéo, 1864. — 20. Femelle, tuée le 21 Mars 1872, Pleyharie, Semmelink.

Individus de Célèbes: teintes du dessus tirant fortement sur le vert. — 17. Mâle, tué le 7 Janvier 1864, Gorontalo, von Rosenberg: joues bleues. — 18. Mâle, aux joues d'un roux passant par-ci par-là, au bleu, tué le 6 Avril 1864, Gorontalo, von Rosenberg. — 19. Mâle aux joues bleues, tué le 26 Mars 1864, Gorontalo, von Rosenberg.

ALCEDO QUADRIBRACHYS. L. c. p. 9.

Un seul individu monté, originaire de la Côte d'or.

ALCEDO SEMITORQUATA. L. c., p. 10.

Ajoutez: 7. Mâle, Abyssinie, 1865. — 8. Femelle, Gabon, 1865.

ALCEDO EURYZONA. L. c., p. 10.

Cinq individus montés de Java et Sumatra.

ALCEDO BERYLLINA. L. c. p. 11.

Observé nulle part que dans l'île de Java.

Ajoutez: 6. Adulte, Java, 1870. — 7, 8, 9. Adultes, Java, Diard, 1864.

ALCEDO CRISTATA. L. c. p. 11, et Alc. cyanostigma, ibid. (oiseau au premier plumage).

Individus de l'Afrique australe. — 1. Adulte, Afr. australe. — 2, 5. Adultes, Cap., 1862. — 4. Mâle, voyage de Boié et Macklot, Cap. — 5. Individu dans la livrée de passage, tué le 7 Déc. 1848, Afr. mér., acquis en 1862. — 6. Jeune mâle, Cafrérie, voyage de Wahlberg. — 7. Jeune mâle, Cap.

Individus de l'Afrique occidentale. — 8. Jeune mâle, tué le 15 Mars 1868, Mossamides, voyage de Sala. — 9. Jeune femelle, Bissao, 1865. — 18. Femelle, tuée le 19 Oct. 1867, Mossamides, Sala.

Individus de l'Abyssinie et du Bahr el Gazal. — 10, 11. Mâles adultes, Adoa, Abyssinie, von Heuglin, 1865. — 12, 15. Jeunes femelles, tuées en Déc. 1861, Adoa, Abyssinie, v. Heuglin. — 14, 15, 16. Mâles adultes, Bahr el Ghazal, v. Heuglin, 1865. — 17. Jeune mâle, tué en Févr. 1863, Bahr el Ghazal, v. Heuglin.

ALCEDO COERULEOCEPHALA. L. c., p. 12.

Ajoutez: 2. Mâle adulte, tué en Mai 1865, ilho de Principe, voyage de Dohrn. — 3. Mâle, tué le 26 Avril 1865, Ilho de Principe, Dohrn.

ALCEDO VINTSIOIDES. L. c., p. 12.

Observé à Madagascar et dans l'île de Mayotte.

Ajoutez: 2. Femelle, tuée le 4 Juillet 1865, rivière Sambérano, Côte N. Ou. de Madagascar, voyage de Pollen et van Dam. — 3. Mâle, baie de Kamando, Madagascar, voyage de M. Lantz, 1866. — 4. Mâle, île St. Marie, Côte Est de Madagascar, Pollen et van Dam, 1865. — 5, 6. Mâle et femelle,

tués le 19 Mai 1864; Mayotte, Pollen et van Dam. — 7, 8. Mâle et femelle, tués vers la fin du mois de Mai 1865, Mayotte, Pollen et van Dam.

ALCEDO LEUCOCEPHALA. L. c., p. 13. — Ajoutez aux synonymes de l'espèce. *Pelargopsis Gouldii*, Sharpe, de Luçon: variété aux ailes tirant sur le vert, semblable à ce que l'on observe dans plusieurs individus de Java; *Pelargopsis Fraseri*, Sharpe: individu de Java à teinte de la tête claire; *Halcyon gural*, Pearson: individu de l'Inde continentale, à teinte de la tête un peu plus foncée que dans les autres individus de l'Inde continentale; *Pelargopsis Burmanica*: individu à teinte de la tête tirant un peu au gris; *Pelargopsis malaccensis* Sharpe, de Malacca, sans caractère sensible, et *Pelargopsis Floresiana*, Sharpe, de l'île de Flores: à tête un peu plus foncée que d'ordinaire.

Notez, toutefois, que l'intensité de la teinte de la tête varie ordinairement dans les différents individus de la même localité.

L'espèce a été observée sur le continent Indien jusqu'à Siam et Malacca, à Ceylon, aux Philippines, à Bornéo, Bangka, Sumatra, Java et Flores.

Ajoutez après le N^o. 18.

Individu de Siam. — 19. Mâle, 1865: c'est *Pelarg. Burmanica*, Sharpe.

Individus de Java. — 20, 21. Adultes, Java, 1864, voyage de Diard. — 22. Adulte, Pourakarta, prés. en 1865 par M. B. Lautier. — 32. Individu acquis en 1870.

Individus de Bornéo. — 25. Mâle, à tête d'un jaune d'ocre uniforme, tué le 3 Août 1866, Pleyharie, Bornéo mérid., prés. par M. Semmelinck. — 24, 25. Adultes, Pleyharie, Semmelinck, 1867. — 26. Jeune, à tête passablement foncée, tué le 25 Avril 1867, Pleyharie, Semmelinck.

27, 28. Individus tués à Sumatra, 1872.

Individus de l'île de Bangka. — Semblables à ceux de Sumatra. — 29, 30. Mâles, tués en Juillet 1872; prés. par M.

O. Vosmaer. — 51. Femelle, tuée le 10 Déc. 1872, prés. par M. O. Vosmaer.

Squelettes: 33, 34, 35. Java, Kuhl et van Hasselt. — 36. Bornéo, Schwaner.

ALCEDO AMAUROPTERA. — Halcyon amauroptera, Pearson.

1. Mâle, Sumatra. — 2. Jeune individu, Sumatra. — 3. Individu des bouches de l'Irawaddi, 1865.

ALCEDO MELANORHYNCHA. L. c., p. 15.

Ajoutez: 3, 4. Mâles, tués en Mai 1863, Modelido, Célèbes, v. Rosenberg. — 5. Femelle, tuée le 10 Mai 1865, Modelido, von Rosenberg. — 6. Femelle, tuée le 3 Août 1864, Pagouat, Célèbes, von Rosenberg. — 7. Mâle, tué le 22 Juin 1865, Posso, Célèbes, v. Rosenberg. — 8. Mâle, tué en Févr. 1864, Soula-mangola, Bernstein. — 9. Femelle, tuée en Janvier 1864, Soula-Mangola, Bernstein. — 10. Femelle, tuée en Février 1864, Soula-Mangola, Bernstein. — 11. Jeune individu, tué en Févr. 1864, Soula-Mangoli, Bernstein. — 12. Mâle, tué en Janvier 1864, Soula-Bessie, Bernstein. — 13. Adulte, Célèbes, prés. en 1866 par Jonkh. R. v. Duyvenbode.

ALCEDO LEUCOGASTER. L. c., p. 15.

Deux individus montés.

ALCEDO PICTA. L. c., p. 16.

1, 2, 3, 4, 5. du Catal. de 1864.

ALCEDO NATALENSIS. Smith. — Alc. picturata, Schleg., Alced. 1864, p. 16.

Habite la Cafrérie et l'Abyssinie.

Ajoutez: 4. Mâle, tué en Mai 1862, rivière Reb, Abyssinie, v. Heuglin: c'est, Alcedo picta, N^o. 6 du Catal. de 1864. — 5. Individu de la Cafrérie, 1868.

ALCEDO LACONTEI. L. c., p. 16. — *Ispidina ruficeps*, Hartlaub (adult.)

Je crois que l'individu de Cassin, type de son *Alc. Lacontei* représente le premier plumage du *ruficeps*, vu qu'un changement de teintes semblable a aussi lieu dans l'*Alcedo leucogaster*.

Un seul individu monté.

Alcyone

N. 12

ALCEDO AZUREA. L. c., p. 17. — J'ajoute aux synonymes de cette espèce: *Alcyone diemensis* et *pulchra*, Gould; puis *Alcyone Lessonii*, Cassin et *Alcyone affinis*, Gray; n'ayant su découvrir la moindre différence entre tous ces oiseaux.

Observé dans l'Australie et la Tasmanie, dans le groupe d'Arou (Wallace), à la Nouvelle Guinée, dans l'île de Soëk (baie de Geelvink), et à Halmahéra avec Batjan.

Ajoutez: 9. Adulte, Cap York, 1872. — 22. Jeune individu, Cap York, 1870. — 10. Mâle adulte, tué le 12 Sept. 1863, Batjan, Bernstein. — 11. Mâle, tué le 23 Nov. 1862, Bessa, Côte N. Est de Halmahéra, Bernstein. — 12. Femelle, tuée le 18 Janv. 1863, Kia, Côte Sud-Est de Halmahéra, Bernstein. — 15, 14. Mâle et femelle, tués en Juin 1869, Andai au Sud de Dorey, v. Rosenberg. — 15, 16. Mâles, tués en Mars 1870, Andai, von Rosenberg. — 17. Femelle, tuée le 10 Mars 1870, Andai, von Rosenberg. — 18. Mâle, tué le 19 Mars 1869, île de Soëk, von Rosenberg. — 19, 20, 21. Femelles, tuées en Mars 1869, Soëk, v. Rosenberg.

ALCEDO SOLITARIA. L. c., p. 17.

Observé à la Nouv. Guinée (Lobo, Sorong, Dorey, Andai), à Salawattie, Batanta, Misool et dans le groupe d'Arou. Notez que le N^o. 2 du Catal. de 1865 vient de Misool et non pas de Céram.

Individus de la Nouv. Guinée. — 1. Mâle adulte, Baie Lobo; S. Müller: indiv. type de l'espèce, fig. Pl. col. 595, 2. — 2. Mâle, tué le 21 Déc. 1864, Sorong, Bernstein. — 3. Femelle,

tuée le 14 Janvier 1869, Dorey, v. Rosenberg. — 4. Femelle, tuée le 25 Mars 1870, Andai, v. Rosenberg. — 5. Mâle, tué le 2 Mai 1870, Andai, v. Rosenberg. — 6. Mâle, tué le 4 Juin 1869, Andai, von Rosenberg.

Individus de l'île de Salawattie. — 7. Mâle, tué le 9 Mars 1865, Kalwal, Bernstein. — 8, 9. Femelles, tuées le 5 Mars 1865, Kalwal, Bernstein. — 10. Mâle, tué le 11 Juillet 1867, Saïlolo, Bernstein.

Individus de l'île de Batanta. — 11. Mâle: tué le 29 Juin 1869, v. Rosenberg. — 12. Femelle, tuée le 1 Juillet 1867, v. Rosenberg.

Individus de l'île de Misool. — 13. Femelle, tuée le 30 Juin 1867, Waaigama, Hoedt. — 14. Mâle, tué le 5 Juin 1867, Kasim, Hoedt. — 15. Mâle, tué le 22 Juillet 1867, Waaigama, Hoedt. — 16, 17. Mâle et femelle, tués le 8 Août 1867, Waaigama, Hoedt. — 18. Adulte: c'est le N^o. 2 du Catal. de 1863.

Individus du groupe d'Arou. — 19. Mâle, tué le 3 Avril 1865, Wokam, v. Rosenberg. — 20. Mâle, tué le 12 Mai 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg.

ALCEDO PUSILLA. L. c., p. 18.

Observé à la Nouv. Guinée, dans l'Australie sept., dans le groupe d'Arou, dans les îles de Misool, Gagie, Halmahéra, Ternate et Obi.

Ajoutez: 2. Jeune individu, Australie sept., 1870. — 3. Mâle, tué le 25 Févr. 1865, Wammer, Arou, v. Rosenberg. — 4. Mâle, tué le 24 Mai 1865, Wonoumbai, Arou, v. Rosenberg. — 5. Mâle, tué le 15 Juin 1865, Wonoumbai, Arou, v. Rosenberg. — 6, 7. Mâle et femelle, tués en Mai 1867, Kasim à Misool, Hoedt. — 8. Femelle, tuée le 4 Mars 1865, île de Gagie, Bernstein. — 9. Mâle, tué le 9 Juin 1863, Wéda à Halmahéra, Bernstein. — 10. Femelle, tuée le 2 Sept. 1865, Ternate, Bernstein. — 11, 12. Mâles, tués en Août 1862, Obi-lattou, Bernstein.

ALCEDO CYANIPECTUS. L. c. p. 18. — *Acyone cyanipectus* et *Ceyx philippensis*, Gould; Sharpe, *Alcedinidae*, p. 55, pl. 17 et p. 113, pl. 37.

Habite les Philippines.

Ajoutez: 3. Femelle, Philippines, 1865.

DACELO.

DACELO GIGAS. L. c., p. 19.

Ajoutez: 4, 5. Individus tués à Melbourne, 1871. — 6. Individu tué à Melbourne, prés. en 1865 par M. F. Müller. — 7. Individu au premier plumage, rivière Hasting, Port Macquarie, acquis en 1864 du Musée de Sidney. — 8, 9, 10. Individus acquis en 1866, Australie.

DACELO CERVINA. L. c., p. 19. — *Dacelo occidentalis*, Gould: Sharpe, p. 291, pl. 115.

Ajoutez: 3. Mâle adulte, Port Albany, 1867. — 4. Mâle dans la livrée de passage, Port Albany, 1867. — 5. Femelle, Port Albany, 1867. Notez que ces trois individus ont été examinés et déterminés par M. Sharpe comme appartenant au *Dacelo occidentalis* de Gould.

DACELO LEACHII. L. c., p. 20.

Deux individus montés du Port Essington, voyage de Gilbert, envoyés par M. Gould sous le nom de *Dacelo Leachii*. Ces individus ont été examinés par M. Sharpe et nommés *Dacelo cervina*.

DACELO GAUDICHAUDII. L. c. p. 20.

Notez que l'individu N^o 3 du Catal. de 1864 vient de Misool et non pas de Céram, et que le N^o. 5 du même catalogue appartient au *Dacelo tyro*.

Observé par nos voyageurs dans la groupe d'Arou, dans les îles de Misool, Salawattie, Batanta et Wœaighéou, à la Nou-

velle Guinée (Lobo, Seléh, Sorong, Dorey, Andai) et dans les îles de Méosnoum et Jobie (du groupe de Geelvink).

Individus du groupe d'Arou. — 1, 2. Mâle et femelle, tués en Avril 1864, Wammer, Hoedt. — 3, 4. Mâles, tués en Févr. 1865, Wammer, v. Rosenberg. — 5. Mâle, tué le 4 Mars, 1865, Wammer, von Rosenberg. — 6, 7, 8. Mâles, tués en Mars 1865, Wokam, von Rosenberg. — 9. Jeune mâle, tué le 15 Mars 1865, Wokam, v. Rosenberg. — 10, 11. Jeunes femelles, tuées en Mars 1865, Wokam, v. Rosenberg. — 12. Mâle, tué le 8 Juillet 1865, île de Trangan, v. Rosenberg.

Individus de Misool. — 13. Mâle, tué le 7 Mai 1867, Waai-gama, Hoedt. — 14, 15. Femelles, tuées en Mai 1867, Waai-gama, Hoedt. — 16. Mâle, tué le 9 Mai 1867, Adoa, Hoedt. — 17, 18. Femelles, tuées le 2 Mai 1867, Adoa, Hoedt. — 19. Mâle, tué le 4 Juin 1867, Hoedt. — 20. Femelle, tuée le 28 Mai 1867, Kasim, Hoedt. — 21. Adulte, Misool, prés. en 1862 par M. B. Moens.

Individus de l'île de Salawattie. — 22. Femelle, tuée le 22 Juin 1867, Sailolo, Hoedt. — 23. Femelle, tuée le 6 Févr. 1870, v. Rosenberg.

Individu de l'île de Batanta. — 24. Mâle, tué le 8 Nov. 1864, Bernstein.

Individus de l'île de Waaighéou. — 25, 26. Mâle et femelle, voyage de l'Uranie: ce sont les Nos 1 et 2 du Catal. de 1863. — 27, 28, 29, 30. Mâles, tués en Mars 1863, Bernstein. — 31, 32. Femelles, tuées en Mars 1865, Bernstein. — 33. Mâle, tué le 9 Avril 1865, Bernstein. — 34, 35. Femelles, tuées en Avril 1865, Bernstein. — 36. Femelle assez jeune, tuée le 9 Avril 1865, Bernstein.

Individus de la Nouvelle Guinée. — 37. Femelle, baie Lobo, S. Müller: c'est le N° 4 du Catal. de 1865. — 38. Femelle, tuée le 18 Févr. 1865, Seléh au Sud de Sorong, Bernstein. — 39, 40. Mâle et femelle, tués en Janvier 1865, Sorong, Bernstein. — 41, 42. Mâle et femelle, tués en Novembre 1864,

Sorong, Bernstein. — 43. Mâle, tué le 26 Déc. 1868, Sorong, v. Rosenberg. — 44. Mâle, tué le 31 Août 1863, Dorey, Hoedt. — 45, 46. Mâle et femelle, tués en Janvier 1869, Dorey, v. Rosenberg. — 47. Mâle, tué le 1 Mars 1870, Andai, v. Rosenberg. — 48, 49. Femelles, tuées en Mars 1870, Andai, v. Rosenberg.

Individus de îles de Méosnoum et de Jobie. — 50, 51. Mâles, tués en Mai 1869, Méosnoum, von Rosenberg. — 52, 53. Mâles, tués en Avril 1869, île de Jobie, v. Rosenberg.

DACELO TYRO, Gray.

Observé nulle part que dans le groupe d'Arou.

1. Adulte, rapporté d'Arou, en 1824, par M. Bik, acquis en 1858: c'est *Dac. Gaudichaudi*, N° 5 du Catal. de 1863. — 2. Mâle, tué le 16 Mai 1864, Wammer, Hoedt. — 3, 4. Femelles, tuées en Mai 1864, Wammer, Hoedt. — 5, 6. Mâles, tués en Janvier 1865, Wammer, von Rosenberg. — 7, 8. Femelles, tuées en Janvier 1865, Wammer, von Rosenberg. — 9. Fémelle, tuée le 17 Févr. 1865, Wammer, v. Rosenberg. — 10. Très jeune mâle, tué le 4 Mars 1865, Wammer, v. Rosenberg. — 11. Mâle, tué le 9 Mai 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg.

DACELO PULCHELLA. L. c. p. 21.

Observé à Java et à Sumatra; ainsi qu'à Burmah et Malacca. Cinq individus montés et le squelette.

DACELO MELANOPS. L. c. p. 21.

L'espèce paraît être bornée à l'île de Bornéo.

Deux individus montés.

DACELO MACRORHINA. L. c., p. 22.

Observé à la Nouvelle Guinée (Dorey, Andai) et dans les îles de Misool et de Waaighéou. Notez que les individus de cette dernière île offrent les taches du dos et des ailes très claires et d'un jaune verdâtre vif.

Individus de la Nouvelle Guinée. — 1. Individu au plumage imparfait, Dorey, Wallace, acquis en 1863. — 2. Mâle adulte, Dorey, 1870. — 3. Très jeune mâle, tué le 12 Janvier 1869, Dorey, von Rosenberg. — 4. Femelle, tuée le 2 Mars 1870, Andaï, von Rosenberg.

Individu de Misool. — 5. Femelle, tuée le 17 Juin 1867, Goë à Misool, Hoedt.

Individus de Waaighéou. — 6. Mâle adulte, tué le 12 Mars 1862, Bernstein. — 7. Mâle adulte, tué le 9 Avril 1864, Bernstein. — 8. Femelle, tuée le 30 Mars 1863, Bernstein.

DACELO CYANOTIS. L. c. p. 22.

Aile 3 pouces 8 lignes à 4 pouces 1 lignes; queue 5 pouces 6 lignes à 3 pouces 8 lignes.

Habite l'île de Célèbes.

Ajoutez: 5. Jeune mâle, tué le 21 Sept. 1863, Negrielama, von Rosenberg. — 6. Mâle, tué le 15 Mai 1863, Modelido, von Rosenberg. — 7. Jeune mâle, tué le 26 Août 1863, Kema, v. Rosenberg. — 8. Femelle, tuée le 26 Août 1863, Kema, v. Rosenberg. — 9, 10, 11. Individus du Célèbes sept., prés. en 1866 par Jonkh. R. van Duyvenbode.

DACELO SANGHIRENSIS, Schlegel. — *Cittura sanghirensis*, Sharpe.

On doit la découverte de cet oiseau à notre voyageur M. Hoedt. J'en avais distribué, en 1866, des doubles, sous le nom de *Dacelo sanghirensis*, dont quelques-uns sont parvenus au Musée Britannique et à M. Sharpe. Il rappelle presque parfaitement le *Dac. cyanotis*; mais il a le front et une tache à la base de la mandibule inférieure laquelle se prolonge sous l'oeil teints de noir, toutes les teintes du plumage beaucoup plus vives et une taille tant-soit-peu plus forte. Aile 5 pouces 9 lignes à 4 pouces 2 lignes; queue 3 pouces 9 lignes. — Notez que le caractère tiré des taches blanches ornant la raie surciliaire noire se retrouve également dans les adultes du *Dac. cyanotis*.

Cet oiseau n'a été observé nulle part que dans l'île de Grand-Sanghir, au Nord de Célèbes.

1, 2, 3. Mâles, tués en Dec. 1865, Hoedt. — 4, 5. Femelles, tuées en Janvier 1866, Hoedt. — 6, 7. Mâles, tués à Grand-Sanghir, prés. en 1866 par Jonkh. R. van Duyvenbode. — 8. Femelle, Grand-Sanghir, R. van Duyvenbode, 1866.

DACELO LINDSAYI. L. c., p. 25.

Deux individus montés.

DACELO TOROTORO. L. c., p. 25. — Il convient de rappeler que la *Sima flavirostris* de Gould de la presqu'île de York du Nord de l'Australie ne diffère pas du *Dac. torotoro*, et que tous les caractères assignés à cette soi-disante espèce par M. Sharpe (*Alcedinidae*) p. 155 se retrouvent également dans certains individus des autres localités qu'habite l'espèce.

Bec brun dans les jeunes; jaune dans les adultes, quelquefois teint de noirâtre le long du dessus de la mandibule supérieure. Sommet de la tête de la femelle avec une tache noire, variable par rapport à son étendue et peu apparente dans les jeunes individus.

Observé à la Nouv. Guinée (Lobo, Sorong, Dorey, Andai), dans les îles de Jobie, Waaighéou Salawattie et Misool, dans le groupe d'Arou, enfin dans la presqu'île York de l'Australie septentrionale (Gould).

Individus de la Nouv. Guinée. — 1, 2, 3. du Catal. de 1863: individus de la baie Lobo. — 4. Mâle, tué le 13 Déc. 1864, Sorong, Bernstein. — 5, 6. Femelles, tuées en Déc. 1864, Sorong, Bernstein. — 7. Mâle, tué le 23 Janvier 1865, Sorong, Bernstein. — 8, 9. Mâle et femelle, tués en Févr. 1865, Sorong, Bernstein. — 10, 11. Mâle et femelle, tués en Janvier 1869, Dorey, v. Rosenberg. — 12, 13. Mâle et femelle, tués en Mars 1870, Andai, von Rosenberg.

Individu de l'île de Jobie. — 14. Mâle, tué le 30 Avril 1869, von Rosenberg.

Individus de l'île de Waaighéou. — 15, 16. Mâle et femelle, tués en Mars 1863, Bernstein. — 17. Jeune femelle à bec brun, tuée le 5 Mai 1863, Bernstein.

Individu de Salawattie. — 18, Femelle, tuée le 9 Juillet 1867, Sailolo, Hoedt.

Individus de Misool. — 19. Mâle, tué le 3 Mai 1867, Waai-gama, Hoedt. — 20. Femelle, tuée le 16 Juillet 1867, Waai-gama, Hoedt. — 21, 22, 23. Mâles, tués en Mai 1867, Kasim, Hoedt. — 24. Femelle, tuée le 21 Mai 1867, Kasim, Hoedt.

Individus du groupe d'Arou. — 25. Femelle, tuée le 14 Mai 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg: bec d'un jaune uniforme. — 26. Femelle, tuée le 23 Mai 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg: devant du dos de la mandibule supérieure tirant au noinâtre. — 27. Mâle, tué le 20 Juin 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg: devant du dos de la mandibule supérieure brun-noir.

• **DACELO PRINCEPS.** L. c. p. 24.

Observé nulle part que dans l'île de Célèbes.

Ajoutez: 6. Mâle, tué le 29 Août 1864, Kema, v. Rosenberg. — 7. Femelle, tuée le 8 Avril 1864, Gorontalo, von Rosenberg. — 8. Mâle, tué le 26 Févr. 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 9, 10. Mâle et femelle, tués en Sept. 1863, Negrie-lama, von Rosenberg. — 11. Femelle, tuée le 22 Sept. 1863, Negrie-lama, v. Rosenberg. — 12, 13. Très jeunes femelles, tuées en Sept. 1863, Tondano, v. Rosenberg. — 14. Mâle, Célèbes, prés. en 1866 par Jonkheer R. v. Duyvenbode. — 15. Mâle dans la livrée de passage, Célèbes prés. en 1866 par J. R. v. Duyvenbode. — 16. Femelle, Célèbes, 1873. — 17. Jeune individu, Célèbes, 1873.

• **DACELO FULGIDUS.** L. c., p. 24.

Observé dans les îles de Lombock et Flores.

1. Mâle adulte, Lombock, Wallace, acquis en 1866. — 2. Adulte, Flores, Wallace, acquis en 1867.

DACELO COROMANDA. *Dacelo coromandeliana* et *coromandeliana minor*. L. c., p. 25.

Observé sur le continent de l'Inde jusqu'à Malacca, au Japon,

aux Philippines, à Formosa (Sivinhoe), au groupe de Sanghir (Grand-Sanghir, et Siao), à Célèbes, au groupe de Soula, à Bornéo, Bangka, Sumatra et Java.

Varie suivant les localités, soit par sa taille, soit par la teinte du croupion. Il existe encore des variations individuelles.

Individus du Japon. — Aile 4 pouces 4 lignes. Croupion d'un vert-bleu argenté, par ci par là pourpré. — 1. Adulte, voyage de Bürger. — 2. Jeune, Japon, Bürger.

3. Individu au premier plumage, tué aux Philippines, 1865; taille et teintes du croupion comme dans les individus du Japon.

4. Mâle de l'île Grand Sanghir, tué le 22 Janvier 1866, Hoedt: aile 4 pouces 8 lignes; croupion comme dans les individus du Japon et des Philippines.

5. Femelle de l'île de Siao, prés. en 1866 par Jonkh. R. v. Duyvenbode: aile 4 pouces 1 ligne; croupion d'un vert-bleu argenté.

Individus de l'île de Célèbes. Aile 5 pouces 11 lignes à 4 pouces 4 lignes; croupion d'un vert-bleu argenté, quelquefois assez foncé. — 6. Mâle, tué le 12 Mai 1863, Modélido, von Rosenberg. — 7. Mâle, tué le 22 Sept. 1865, Negrie-lama, v. Rosenberg. — 8. Mâle, tué le 22 Août 1864, Kéma, v. Rosenberg. — 9, 10. Mâle et femelle, tués le 29 Sept. 1864, Kéma, von Rosenberg. — 11, 12. Mâles, tués dans le Nord de Célèbes, prés. en 1866 par Jonkh. R. v. Duyvenbode. — 13, 14. Femelles, même origine.

Individus du groupe de Soula. Aile 4 pouces 2 lignes à 4 pouces 7 lignes; croupion d'un blanc argenté tirant, vers le derrière, au vert-bleu, mais dans le N^o 20 teint entièrement de vert-bleu argenté. — 16, 17. Mâle et femelle, tués le 17 Nov. 1864, Soula-Bessie, Bernstein. — 18. Mâle, tué le 11 Déc. 1864, Soula-Mangola, Hoedt. — 19. Mâle, tué en Janvier 1864, Soula-Mangola, Bernstein. — 20. Femelle, tuée en Janvier 1864, Soula-Bessie, Bernstein.

15. Adulte, Cab. Temminck, indiqué comme provenant de Java: aile 4 pouces 3 lignes; croupion d'un blanc argenté ti-

rant, vus le derrière, légèrement au vert-bleu. Dessus de la tête pourpré.

Individus de l'île de Bornéo. Aile 3 pouces 8 lignes à 3 pouces 9 lignes. Dessus de la tête et croupion comme dans l'individu N^o 15. — 21. Mâle, Pontianak, Diard. — 22. Adulte, Bornéo mér., voyage de Crocquewit.

23. Mâle, tué à Padang, île de Sumatra, S. Müller: aile 3 pouces 11 lignes; teintes comme dans les individus de Bornéo.

Individus de l'île de Bangka. Aile 3 pouces 9 lignes à 3 pouces 11 lignes. Teintes comme dans les individus de Sumatra et Bornéo. — 24. Mâle, tué le 31 Janvier 1873, prés. par M. O. Vosmaer. — 25. Mâle, tué le 18 Févr. 1873, même origine. — 26. Jeune mâle, tué le 11 Juillet 1872, même origine.

27. Squelette, Japon, von Siebold. — 28. Squelette, Java, Kuhl et van Hasselt. — 29. Crâne. Java, Kuhl et van Hasselt.

DACELO CONCRETA. L. c., p. 26.

Observé à Bornéo, Sumatra et Malacca.

Ajoutez: 7. Jeune mâle, Malacca, 1867.

DACELO PILEATA. L. c. p. 27.

Observé sur le continent Indien jusqu'au Ceylan et en Chine, aux Philippines, à Bornéo et à Sumatra.

Ajoutez: 4. Mâle, Cochinchine, 1865. — 5. Individu à-peu près au plumage parfait, Bornéo, 1870.

DACELO CYANIVENTRIS. — *Dac. melanoptera*, L. c. p. 27. —

Alcedo cyaniventris, Vieillot. — *Alcedo omnicolor*, Reinwardt.

Paraît habiter exclusivement l'île de Java.

Ajoutez: 6, 7, 8. Adultes, Java, 1864, Diard. — 9. Jeune, Java, Diard, 1862. — 10. Femelle Java, 1870.

DACELO EUSCA. L. c., p. 28 (ex parte). — *Halcyon smyrnensis*, auct.

Réparti dans l'Asie chaude, depuis l'Asie mineure jusqu'aux îles Andaman, à Ceylan, en Chine, et dans l'île de Formosa.

Notez que les individus de l'Asie mineure et de la Syrie sont en général d'une taille plus forte et ceux de Ceylan d'une taille plus petite que la plupart de ceux des autres contrées que fréquente l'espèce.

1. Individu des environs de Smyrne; mâle, tué en Sept. 1870. Krüper: aile 4 pouces 6 lignes.

2. Individu de la Syrie; mâle, 1863: aile 4 pouces 9 lignes.

3. Individu du Nipaul; mâle, prés. par M. Hodgson: aile 4 pouces 9 lignes.

Individus de l'Inde en deça du Gange. Aile 4 pouces 3 lignes à 4 pouces 5 lignes. — 4. Femelle, Hindoustan, 1865. —

5. Adulte, Bengale. — 6. Adulte, Inde continentale.

Individus de la Chine. Aile 4 pouces 8 lignes. — 7. Femelle, Emoy, par M. Swinhoe, 1863. — 8. Adulte, Macao, Swinhoe, 1863.

Individus de Ceylon. Aile 4 pouces 2 lignes à 4 pouces 4 lignes. — 9, 10, 11, 12. Adultes, Ceylon, Diard, 1859.

Calcyon

DACELO GULARIS. — *Dacelo fusca* N^o 4 et 11 individus des Philippines, du Catal. de 1863. — *Alcedo gularis*, Kuhl.

Observé nulle part que dans les Philippines.

1. Adulte, tué à Luçon et prés. en 1875 par Jonkh. H. Gevers. — 2. Jeune mâle, Philippines, 1873. — 5. Mâle, Philippines.

= *Dacelo fusca* Bat. 1863. N^o 1. (est une *Gularis*)

DACELO BADIA. L. c., p. 28.

Un seul individu monte du Gaboon.

DACELO SEMICOERULEA. L. c., p. 29. — *Alcedo erythrogaster*, Temminck.

Il n'existe guère de caractère sensible pour séparer les individus de l'Afrique occidentale (*erythrogaster*) de ceux de l'Afrique orientale.

Individus de l'Afrique chaude orientale. — 1, 2, 3 du Catal. de 1863. — 4. Femelle, tué en Août 1861, Kéren, Abyssinie, von Heuglin.

Individus de l'Afrique chaude occidentale. — 5. Adulte, Canaries; un des types de l'*Alcedo erythrogaster* de Temminck. — 6. Jeune individu, Sénégal. — 7. Mâle, Bissao, 1866. — 8, 9, Mâles, tués en Mars 1865, île St. Jago du Cap vert, voyage de Dohrn. — 10. Femelle, tuée en Mars 1865, St. Jago Dohrn. — 11. Mâle de l'année, tué en Mars 1865, St. Jago, Dohrn.

Les quatre espèces qui vont suivre ont donné lieu à une grande confusion.

Halcyon cinereifrons, L.

DACELO CINEREIFRONS. L. c., p. 29. — *Halcyon malimbica*, Sharpe (ex parte: pl. 72, fig. antérieure.)

Notez que cet oiseau n'a pas été observé à la Côte d'or. Adultes: aile 4 pouces 6 lignes; queue 3 pouces 6 lignes; bec, depuis le front, 2 pouces et 2 à 3 lignes.

1, 2. Adultes, Sénégal. — 3. Femelle à-peu-près adulte, Bissao, 1865.

DACELO MALIMBIGA. — *Halcyon malimbica*, Sharpe, *Alcedinidae*, p. 196, pl. 72, fig. postérieure. — *Dacelo dryas* de notre Catal. de 1865, p. 30.

En général semblable au *Dac. cinereifrons*, mais d'une taille considérablement moins forte, aux teintes beaucoup plus vives et plus pures, et au jabot d'un beau vert aigue-marine. Aile 4 pouces et 2 à 3 lignes; queue 2 pouces 9 lignes à 3 pouces; bec 1 pouce et 9 à 10 lignes.

Quatre individus montés, du voyage de M. Pel à la Côte d'or.

DACELO DRYAS, Hartlaub, à l'exception des individus de la Côte d'or.

Aile 4 pouces 6 lignes; queue 3 pouces 2 lignes; bec 2 pouces à 2 pouces 2 lignes.

Observé dans les îles du Cap-vert.

1. Femelle adulte, tuée en Mars 1865, Ilho de Principe, voy. de Dohrn. — 2. Mâle, tué le 25 Mai 1865, Ilho do Principe, Dohrn. — 3. Mâle de l'année, tué en Juin 1865, Ilho do Principe, Dohrn. — 4, 5, 6. Jeunes de l'année, tués en Nov. 1865, Ilho do Principe, voyage de Keulemans.

DACELO SENEGALENSIS. L. c., p. 50. — *Halcyon senegalensis* et *cyanoleuca*, Sharpe, Monogr. Alced., pl. 70 et 69.

Reconnaissable, parmi les trois espèces précédentes, à sa petite taille. Aile 3 pouces 7 lignes à 4 pouces 3 lignes; queue 2 pouces et 5 à 7 lignes; bec environ de 18 lignes.

Nous n'avons reçu cette espèce que de la Sénégambie, de la Côte d'or, du Gaboon et de l'Abyssinie. (~~Forster & G. Cuvier~~)

Ajoutez: 6. Femelle, Gaboon, 1866. — 7, 8. Mâle et femelle, tués en Oct. 1863, [Bongo] ~~en Abyssinie~~, von Heuglin. [

DACELO ALBIVENTRIS. L. c., p. 51.

Habite l'Afrique australe.

Neuf individus montés.

DACELO CHELICUTI, et *striolata*, L. c., p. 52 et 51.

1, 2. Mâles, Abyssinie, Rüppell. — 3, 4. Femelles, Abyssinie, Rüppell. — 5. Individu de l'Abyssinie. — 6. Femelle, Abyssinie, v. Heuglin, 1865. — 7. Femelle, tuée en Sept. 1863, Bongo, Abyssinie, v. Heuglin. — 8, 9. Mâle et femelle, Sénégal. — 10. Femelle, Cafrérie.

11. Squelette, Abyssinie.

DACELO CHLORIS, et *Forsteni* L. c. p. 32 et 37. — *Halcyon sordidus*, Gould.

Teinte d'un vert bleuâtre des parties supérieures assez variable suivant les individus; en outre, quelquefois, suivant les localités.

Le *Dacelo Forsteni*, notre N^o 56 du *Dac. chloris*, ne repose que sur l'une de ces variétés accidentelles, dont les N^{os} 131, 85, 107, 109, 118, 120 et 121, présentent d'autres exemples.

Observé en Abyssinie et aux Indes orientales jusqu'aux Philippines et l'île de Pelese, à la Côte occidentale de la Nouvelle Guinée et dans l'Australie septentrionale. Notez que les individus de l'île de Pelew sont en tout point semblables à ceux de Halmahéra.

Individus de l'Abyssinie: parfaitement semblables à ceux des Philippines; mais au vert du dessus de la tête tirant fortement au brun: — 1. Mâle, tué le 19 Juin 1861, île Schech-Saïd, pays des Bogos, von Heuglin. — 2. Adulte, Abyssinie, 1862.

3. Individu mâle de Poulo-Pinang, 1867: teinte du dessus très vive, passant au bleu intense sur les ailes et la queue.

4. Mâle adulte de la Cochinchine, 1863: teintes aussi vives que dans l'individu de Poulo-Pinang.

Individus des Philippines: teintes du dessus passablement ternes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. voyage de Cuming. — 13. Adulte, Luçon, prés. en 1873 par Jonkh. H. Gevers. — 14. Très jeune femelle, Philippines, 1863.

Individus de Bornéo: teintes semblables aux individus des Philippines. — 15. Adulte, Banjer-massing, Schwaner. — 16. Jeune mâle, Banjer-massing, Schwaner. — 17. Femelle, tuée le 10 Oct. 1844, Tjantang, Schwaner.

18. Adulte tué à Bencoulen dans l'île de Sumatra, prés. en 1865 par M. Wienecke: semblable aux individus des Philippines. — 133, 134. Individus tués à Padang, 1872.

Individus de l'île de Bangka: teintes des adultes presque aussi vives que dans nos individus de Poulo-Pinang et de la Cochinchine. — 19, 20, 21, 22. Individus prés. en 1862 par M. J. R. M. S. van den Bossche. — 23. Mâle adulte, tué le 2 Févr. 1873, prés. par M. O. Vosmaer. — 24. Mâle, tué le 28 Août 1873, O. Vosmaer. — 25. Femelle, 1875, Vosmaer.

Individus de Java: teintes encore semblables aux individus des Philippines, rarement un peu plus vives. — 26, 27. Mâle et femelle, Boié. — 28. Adulte, Gadok, Bernstein, 1859. —

29, 30. Individus tués à Pourakarta, prés. en 1865 par M. B. Lautier. — 31, 32. Adultes, voyage de Junghuhn; 1864. — 33, 34, 35, 36, 37. voyage de Diard, 1864. — 38. Femelle, Java, 1870. — 39. Jeune, voyage de Blume.

Individus de l'île de Siao (groupe de Sanghir). — 40. Femelle adulte, tuée le 11 Nov. 1865, Hoedt. — 41. Femelle, prés. en 1866 par Jonkh. R. van Duyvenbode.

Individus de Célèbes: teintes comme dans les individus de Java. — 42. Mâle, tué le 9 Mars 1864, Gorontalo, von Rosenberg. — 43, 44. Mâles, tués en Avril 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 45. Femelle, tuée le 23 Avril 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 46, 47. Mâles, tués en Mai 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 48. Femelle, tuée le 4 Mai 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 49. Mâle, tué le 19 Août 1863, Ayerpannas, v. Rosenberg. — 50. Mâle, tué le 31 Août 1863, Limbotto, v. Rosenberg. — 51. Très jeune mâle, tué le 28 Mars 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. — 52, 53, 54, 55. Adultes, Célèbes sept., prés. en 1870 par M. Riedel. — 56. Femelle, variété aux plumes blanches irrégulièrement tachetées de noir verdâtre, Gorontalo, Forsten: c'est *Dacelo Forsteni* du Cat. de 1863. — 57. Mâle, tué le 21 Sept. 1863, Negri-lama, v. Rosenberg: variété offrant les côtés de la tête jusque sur le jabot d'un gris noirâtre.

Individus de l'île de Soula-Bessie: semblables à ceux de Célèbes. — 57. Mâle, tué en Janvier 1864, Bernstein. — 58. Femelle, tuée en Févr. 1864, Bernstein.

Individus de l'île de Halmahéra: semblables à ceux de Célèbes. — 59. Femelle, tuée le 11 Juin 1863, Wéda à la Côte Sud, Bernstein. — 60. Mâle, tué le 19 Juillet 1861, Galéla, Côte Nord, Bernstein. — 61. Femelle, tuée le 1 Août 1861, Galéla, Bernstein.

Individus de Ternate. — 62, 63. Femelles, tuées le 30 Avril 1861, Bernstein.

Individus de Tidore. — 64, 65. Femelles tuées en Avril 1862, Bernstein.

66. Mâle adulte de l'île de Maréh, tué le 11 Août 1864, Bernstein.

Individus de l'île de Batjan. — 67. Femelle, tuée en Janvier 1861, Bernstein. — 68. Mâle, tué en Mars 1861, Bernstein. — 69, 70. Jeunes femelles, tuées en Mars 1861, Bernstein. — 71. Mâle, tué le 11 Sept. 1862, Bernstein. — 72, 73. Individus prés. en 1866 par M. Jungmichel.

74. Femelle, tuée dans l'île de Morotai le 8 Sept. 1861, Bernstein.

Individus du groupe d'Obi. — 75. Mâle, tué le 23 Juillet 1862, Obi-major, Bernstein. — 76, 77, 78. Femelles, tuées en Juillet 1862, Obi-major, Bernstein. — 79, 80. Mâle et femelle, tués en Août 1862, Obi-lattou, Bernstein.

Individus de l'île de Bouro. — 81. Mâle, tué le 1 Sept. 1864, Hoedt. — 82. Mâle, tué le 28 Déc. 1864, Hoedt. — 83. Femelle, tuée le 29 Janvier 1865, Hoedt. — 84. Mâle, Hoedt, 1863. — 85. Femelle tuée le 4 Nov. 1864, Hoedt: dessous tirant au grisâtre et varié, sur les côtés du tronc, de noirâtre.

Individus d'Amblaou, petite île au Sud de Bouro. — 86, 87. Mâle et femelle, tués le 21 Janvier 1865, Hoedt.

Individus d'Amboine. — 88. Mâle, tué le 14 Oct. 1842, Forsten. — 89. Femelle, tuée en Août 1842, Forsten. — 90. Femelle, Forsten. — 91. Femelle, tuée en Avril 1828; S. Müller. — 92, 93. Mâle et femelle, Hoedt, 1863.

94. Mâle, tué à Manipa, île à la Côte Ouest de Céram, Hoedt, 1863.

Individus tués à Céram. — 95. Mâle, Kaybobo à Céram, Forsten. — 96. Individu de Wahaai, prés. en 1862 par M. B. Moens.

97. Mâle, tué à Poulo-Padjang (groupe de Céram-lawout) le 21 Sept. 1865, v. Rosenberg. *N. O. île Céram*

98. Mâle adulte, tué dans l'île de Monavolka, le 14 Sept. 1865, v. Rosenberg: aux teintes assez vives. *Céram lauit*

99. Mâle adulte, tué dans l'île de Koor, à l'Ouest de Petit-

Key, le 2 Sept. 1865, v. Rosenberg: teintes assez vives.

Individus de l'île Petit-Key: teintes assez vives. — 100, 101. Mâles, tués en Août 1865, v. Rosenberg. — 102, 103. Femelles, tuées en Août 1865, v. Rosenberg.

Individus de l'île Grand-Key: teintes passablement vives. — 104, 105. Mâle et femelle, tués en Avril 1865, Hoedt.

Individus de l'île de Banda. — 106. Jeune femelle, tuée en Août 1842, Forsten. — 107. Mâle, tué le 6 Avril 1868, Gounong-Api, Hoedt: ventre pourvu de quelques plumes noires. — 108. Mâle, tué le 23 Avril 1868, Gounong-Api, Hoedt. — 109. Mâle, tué le 29 Avril 1868, Gounong-Api: jabot et côtés du tronc avec des taches d'un gris noirâtre.

110. Individus de l'île de Flores, tué à Larantouka, prés. en 1868 par M. Semmelink.

Individus de Timor. — Teintes comme dans les individus de Java. — 111. Mâle, tué en Août 1829, S. Müller. — 112. Femelle, tuée en Avril 1829, Atapoupou, S. Müller. — 113. Femelle, tuée en Mai 1829, Bauny, S. Müller. — 114. Jeune, S. Müller, 1829.

Individus de l'île de Lettie, située à l'Est de Timor. Teintes des jeunes foncées et ternes, mais ordinaires dans l'individu à-peu-près adulte. — 115. Mâle à-peu-près adulte, tué le 22 Mai 1866, Hoedt. — 116, 117. Jeunes mâles, tués en Mai 1866, Hoedt.

Individus de l'île de Misool. — 118. Mâle, tué le 4 Juin 1867, Kasim, Hoedt: dessous avec des taches d'un gris noirâtre. — 119. Mâle, tué le 18 Mai 1867, Waaigama, Hoedt. — 120, 121. Mâle et femelle, tués en Mai 1867, Waaigama, Hoedt: dessous avec des taches d'un gris noirâtre.

122. Femelle, tuée dans l'île de Salawattie, le 18 Juin 1869, v. Rosenberg.

125. Mâle, tué dans l'île de Gagie, située entre Guebéh et Waaighéou, le 16 Mai 1863, Bernstein.

124. Mâle, tué à Outanata (côte Sud-Ouest de la Nouv. Guinée, S. Müller: teintes du dessus foncées et ternes, semblables à celles du *Halcyon sordidus* de Gould.

Individus du groupe d'Arou. Teintes variables suivant les individus. — 125. Femelle adulte, tuée le 15 Juillet 1865, île de Maykor, von Rosenberg: teintes beaucoup moins foncées que dans le N° 124. — 126. Femelle, tuée le 26 Janvier 1865, île de Wammer, von Rosenberg: teintes à-peu-près comme dans le N° 125. — 127. Jeune femelle, tuée le 25 Janvier 1865, Wammer, v. Rosenberg: tête, manteau, dos et scapulaires d'un brun olivâtre foncé. — 128. Jeune femelle, tuée le 4 Mars 1865, Wammer, v. Rosenberg: teintes comme dans le N° 127.

129, 130, 131, 132. Squelettes, Java, Kuhl et van Hasselt.

DACELO SANCTA. L. c., p. 35.

Nous avons reçu cette espèce de Bangka, Bornéo, Célèbes; Siao, Soula, du groupe de Halmahéra, de Bouro, Amboine, Céram, du groupe de Céram-lawout, de Banda, Petit Key, du groupe d'Arou, de Misool, Salawattie, Waaighéou, de Méosnoum et Jobie, de la Nouv. Guinée, de la Nouvelle Calédonie et de l'Australie.

Individus de Bornéo. — Voir 1, 2, 5, 4, 5 du Catal. de 1864.

6. Mâle de l'île de Bangka, tué le 5 Juillet 1875, prés. par M. O. Vosmaer.

7. Mâle, tué à Célèbes (Gorontalo), le 19 Juillet 1864, von Rosenberg.

8. Femelle, tuée à Siao, île au Nord de Célèbes, prés. en 1866 par Jonkh. R. v. Duyvenbode.

9. Femelle, tuée à Soula-Mangola, le 27 Nov. 1864, Hoedt.

Individus tués à Halmahéra. — 10. Femelle, tuée le 9 Sept. 1861, Galéla, Bernstein. — 11, 12, 15. Femelles, tuées en Juillet 1861, Weda, Bernstein.

14. Femelle, tuée à Ternate le 26 Juillet 1861, Bernstein.

15. Femelle, tuée à Maréh, le 13 Sept. 1865, Maréh, Bernstein.

16, 17. Mâle et femelle, tués à Batjan, en Sept. 1862, Bernstein.

Individus du groupe d'Obi. — 18, 19. Mâle et femelle, tués le 11 Juillet 1863, Obi-major, Bernstein. — 20. Femelle, tuée le 15 Juillet 1863, Obi-major, Bernstein. — 21, 22. Femelles, tuées en Sept. 1863, Obi-lattou, Bernstein.

Individus de l'île de Dammar. — 23. Mâle adulte, tué le 1 Juillet 1865, Bernstein. — 24, 25. Mâle et femelle, tués le 5 Juillet 1865, Bernstein.

26. Femelle, tuée à Bouro, Hoedt, 1865.

Individus d'Amboine. — 27. Mâle, tué en Août 1845, Forsten. — 28. Femelle, tuée en Mai 1842, Forsten. — 29. Mâle, tué le 10 Juin 1864, Hoedt. — 30. Mâle, tué le 14 Sept. 1866, Hoedt.

31. Individu de Wahaï à Céram, prés. en 1862 par M. B. Moens.

Individus de l'île de Goram. — 32, 33. Mâle et femelle, tués en Sept. 1865, von Rosenberg.

Individus de Poulo-Padjan, île au Sud-Est de Céram. — 34. Mâle adulte, tué le 24 Sept. 1865, v. Rosenberg. — 35, 36. Femelles, tuées en Sept. 1865, v. Rosenberg.

Individus de l'île de Banda. — 37, 38. Mâle et femelle, tués en Avril 1868, Gounong-API, Hoedt.

39. Mâle de Petit-Key, tué le 11 Août 1865, v. Rosenberg.

Individus du groupe d'Arou. — 40, 41. Mâle et femelle, tués en Mai 1865, Wonoumbaï, v. Rosenberg. — 42, 43. Mâle et femelle, tués en Mai 1865, Wonoumbaï, von Rosenberg. —

44. Mâle, tué le 12 Juillet 1865, île de Trangan, v. Rosenberg. — 57. Mâle, tué le 10 Juillet 1865, Trangan, v. Rosenberg.

Individus de Misool. — 45. Mâle, tué le 30 Mai 1867, Kasim, Hoedt. — 46, 47. Mâle et femelle, tués en Mai 1867, Waai-gama, Hoedt.

48. Mâle, tué à Salawattie le 18 Juin 1869, v. Rosenberg.

49. Femelle, tuée à Waai-géou, le 12 Avril 1865, Bernstein.

58. Jeune mâle, tué dans l'île de Gagie, le 15 Mai 1863, Bernstein.

Individus de l'île de Méosnoum (baie de Geelvink). — 50. Mâle, tué le 13 Mai 1869, v. Rosenberg. — 51, 52. Femelles, tuées le 13 Mai 1869, v. Rosenberg.

Individus de l'île de Jobie (baie de Geelvink). — 53. Mâle adulte, tué le 23 Avril 1869, v. Rosenberg. — 54. Femelle, tuée le 1 Mai 1869, v. Rosenberg.

Individus de la Nouv. Guinée. — 55, 56. Individus tués dans le détroit de la princesse Marianne, S. Müller.

Individus de l'Australie. — 59. Individu tué au port Denison, Austr. sept., du Musée de Sidney, 1862. — 60. Individu tué sur les bords du Cooks-river, du Mus. de Sidney, 1862. — 61. Individu du Middle-harbour, du Musée de Sidney, 1862. — 62. Individu tué à Melbourne, prés. en 1865 par M. F. Müller. — 63. Individu tué à Melbourne, 1871. — 64. Individu de la Nouv. Galles du Sud, 1873. — 65. Individu au plumage imparfait. — 66. Individu acquis en 1866.

Individus de la Nouvelle Calédonie. — 67. Mâle, 1865. 68, 69. Mâle et femelle, 1868.

70. Individu, obtenu en 1866 de feu Verreaux comme provenant de l'île Vavao, située au nord du groupe de Tonga.

DACELO VAGANS. — Halcyon vagans, J. E. Gray.

C'est un conspecies du *Dac. sancta* qu'il représente à la Nouv. Zéelande et dont il ne se distingue que par sa taille un peu plus forte.

1. Femelle, 1856. — 2. Jeune, 1858. — 3. Mâle, tué en Avril 1870, Côte occid. de l'île méridionale. — 4. Femelle, tuée en Mars 1870, Ile mér. — 5. Femelle, 1865. — 6. Mâle adulte, tué en Déc. 1872, Little River, île méridionale. — 7. Mâle, tué en Juin 1871, Christ-Church, île méridionale.

DACELO PYRRHOPYGIA. L. c., p. 39.

Deux individus montés.

^m**DACELO SACRA.** ^{vt} — *Dacelo Grayi*, l. c., p. 57, mais non

pas *Dac sacra*, *ibid.* p. 58. — *Halcyon sacra* et *Juliae*, auctorum.

Observé aux groupes de Fidji et Tonga, ainsi qu'aux Nouv. Hébrides.

Ajoutez (au *Dac. Grayi*, l. c., p. 58): 4. Adulte, Tonga, expéd. Godeffroy, 1869. — 5. Individu tué au groupe de Fidji, expéd. Godeffroy, 1866. — 6. Adulte, Tonga-tabou, exp. Godeff., 1874.

Todirhamphus

DACELO TUTA. — *Dac. sacra* du Cat. de 1865, p. 58.

Bec un peu aplati et un peu recourbé vers le haut.

Observé aux Marquises et au groupe de Taïti.

1. Adulte, O Taïti. — 2. Adulte, Marquises. — 3. Jeune, Marquises. — 4. Adulte, Marquises, 1866. — 5. Adulte, île Raïatea du groupe de Taïti, expéd. Godeff., 1874.

DACELO RECURVIROSTRIS. — *Todirhamphus recurvirostris*, Lafresnaye.

Rappelant le *Dacelo sacra*; mais à bec aplati et un peu recourbé vers le haut.

Observé au groupe de Samoa.

1. Adulte, Upolu, expéd. Godeffroy, 1867. — 2. Adulte, Upolu, expéd. Godeffroy, 1865. — 3. Adulte, Upolu, Godeff., 1869. — 4. Adulte, Upolu, 1875.

Cypr

DACELO CINNAMOMINA. L. c. p. 59.

Trois individus montés; dont l'un vient des Mariannes. Des deux autres, l'un est indiqué comme provenant des Philippines, l'autre de la Nouvelle Guinée; je doute, cependant, fort de l'exactitude de ces indications, personne n'ayant observé cet oiseau dans ces localités, fréquentés par tant de voyageurs naturalistes.

Halcyon pelcevensis, Wigt. 1891.

DACELO REICHENBACHII. — *Halcyon Reichenbachii*, Hartlaub.

1. Mâle adulte, île Pelew, expéd. Godeffroy, 1874. — 2.

Adulte ; mais au roux du dessus de la tête passant, sur l'occiput, en partie au blanc, et à l'écharpe de la nuque blanche, Pelew, exp. Godef. 1874. — 3. Jeune mâle, Pelew, exp. Godef., 1874.

DACELO CORONATA. L. c., p. 38: — Alcedo Australasiae, Vieillot.

N'ayant été observé que dans les îles de Timor et de Wetter, c'est très mal-à-propos que l'on s'obstine à conférer à cet oiseau l'épithète d'Australasiae.

Ajoutez: 4. Mâle adulte, tué le 26 Avril 1866, Wetter, Hoedt.

DACELO FUNEBRIS. L. c., p. 40.

Ne paraît habiter que l'île de Halmahéra-même.

Ajoutez: 9, 10. Mâle et femelle, tués en Juin 1865, Wéda, Côte mér. Bernstein. — 11. Femelle, tuée le 31 Mai 1863, Wéda, Bernstein. — 12. Mâle, tué le 2 Nov. 1864, Wéda, Bernstein.

DACELO MACLEYI. L. c., p. 40.

Ne paraît habiter que l'Australie septentrionale.

Ajoutez: 4, 5, 6. Adultes, Cap York, 1870.

DACELO DIOPS. L. c., p. 41.

Habite le groupe de Halmahéra (Halmahéra, Ternate, Tidore, Motir, Batjan, Dammar, Obi-lattou, Morotai).

Ajoutez: 19, 20. Mâles, tués le 15 Févr. 1866, Ternate, Hoedt. — 21, 22. Mâle et femelle, tués en Oct. 1863, île de Motir, Bernstein. — 23, 24. Mâle et femelle, tués en Nov. 1863, île de Tidore, Bernstein. — 25. Mâle, tué le 9 Juin 1863, Wéda, Côte Sud de Halmahéra. — 26. Mâle, Halmahéra, v. Rosenberg, 1870. — 27. Très jeune individu, v. Rosenberg, 1870. — 28. Mâle, tué le 7 Sept. 1862, Batjan, Bernstein. — 29, 30. Mâles adultes, Batjan, prés. en 1866 par M. Jungmichel. — 31, 32, 33. Mâles au plumage à-peu-près parfait, Batjan, prés. en 1866 par M. Jungmichel. —

54. Femelle, au plumage à-peu-près parfait, prés. en 1866 par M. Jungmichel. — 35. Mâle, tué le 6 Juillet 1863, île de Dammar, en face de la pointe mér. de Halmahéra, Bernstein. — 56. Mâle, tué le 18 Août 1862, Obi-lattou, Bernstein.

DACELO LAZULI. L. c., p. 42.

Observé à Céram, Amboine et dans la petite île voisine de Harouko ou Oma.

Ajoutez: 8, 9. Mâles, tués le 23 Mars 1866, Amboine, Hoedt. — 10, 11. Mâle et femelle, tués le 8 Août 1866, Amboine, Hoedt. — 12. Femelle, Amboine, Hoedt, 1863. — 13, 14. Mâle et femelle, Assahoudi (côte Ouest de Céram) Hoedt; 1863. — 15. Femelle, tuée le 16 Févr. 1863, Harouko, Hoedt. — 16. Jeune femelle, tuée le 16 Déc. 1863., Harouko, Hoedt: poitrine blanche comme dans les mâles, mais commençant à prendre la teinte d'un bleu-vert du ventre.

DACELO NIGROCYANEA. Voir Schlegel, Obs. zool., II, dans Nederl. Tijdschr. v. Dierkunde, 5, p. 250. — *Halcyon nigrocyanea*, Wallace.

Observé à Salawattie et à la Nouvelle Guinée (Sorong et Andai).

1, 2. Mâles, tués en Mars 1865, Kalwal à Salawattie, Bernstein. — 3, 4. Mâle et femelle, tués le 8 Févr. 1870, Salawattie, von Rosenberg. — 5. Femelle, tuée le 26 Juillet 1867, Saïlolo à Salawattie, Hoedt. — 6. Mâle, tué le 27 Nov. 1864, Sorong, Bernstein. — 7, 8. Femelles, tuées en Janvier 1865, Sorong, Bernstein. — 9, 10, 11. Mâles, tués en Février 1870, Andai, von Rosenberg. — 12, 13. Mâles, tués en Mars 1870, Andai, von Rosenberg. — 14. Mâle, tué le 29 Avril 1870, Andai, von Rosenberg. — 15, 16, 17. Femelles, tuées en Mars 1870, Andai, v. Rosenberg. — 18. Femelle, tuée le 7 Mai 1870, Andai, v. Rosenberg. — 19. Jeune mâle, tué le 7 Mai 1870, Andai, v. Rosenberg: remarquable parce que le blea du dessous est remplacé par du brun-rouge.

DACELO ALBICILLA. L. c., p. 42.

Observé par nos voyageurs à Morotai, Batjan, Dammar, Obi-major, Moor (île à la pointe or. de Halmahéra), Guebéh, Waaighéou, Salawattie, Misool, à la Nouv. Guinée (Sorong, Doréh), et dans les îles Geelvink de Mefoor et Soëk.

Ajoutez: 9. Mâle, tué le 26 Janvier 1863, île de Moor, Bernstein. — 10, 11. Mâle et femelle, tués le 4 Juillet 1863, île de Dammar, Bernstein. — 12. Mâle, tué le 16 Juillet 1862, Obi-major, Bernstein. — 13, 14. Mâle et femelle, tués le 21 Juillet 1862, Obi-major, Bernstein. — 15. Mâle, tué le 8 Février 1863, Guebéh, Bernstein. — 16. Mâle, tué le 11 Avril 1863, Waaighéou, Bernstein. — 17. Femelle, tuée le 17 Juin 1869, Salawattie, v. Rosenberg. — 18. Mâle, tué le 26 Juin 1867, Waaigama à Misool, Hoedt. — 19. Mâle, tué le 17 Mai 1867, Kasim à Misool, Hoedt. — 20, 21. Mâle et femelle, tués le 15 Mai 1867 à Pecan, îlot près de Waaigama à Misool, Hoedt. — 22. Femelle, tuée le 4 Déc. 1864, Sorong, Bernstein. — 23. Mâle, tué le 4 Juin 1869, Dorey, v. Rosenberg. — 24. Femelle, tuée le 21 Janvier 1869, île de Méfoor, v. Rosenberg. — 25. Femelle, tuée le 3 Févr. 1869, Méfoor, v. Rosenberg. — 26, 27. Mâles, tués en Mars 1869, île de Soëk, v. Rosenberg.

Espèces de très petite taille.

a. Quatre doigts.

DACELO MADAGASCARIENSIS. — *Ispidina madag.* auct.

Propre, à ce qu'il paraît, à l'île de Madagascar.

1. Femelle, tuée le 15 Août 1865, Ambaniata, Pollen et van Dam. — 2, 3. Mâles, tués à la Côte N. Ouest, van Dam, 1668. — 4. Femelle, Côte N. Ouest, van Dam, 1868.

DACELO FALLAX, Schlegel, Obs. zool. I, dans *Nederl. Tijdschr. v. Dierkunde*, 3, p. 187. — *Ceycopsis fallax*, Salvadori: *Sharpe Alcedin.* p. 135, pl. 48.

Habite l'île de Célèbes.

1. Femelle, tuée le 7 Mars 1864, Gorontalo, v. Rosenberg. —
- 2, 3. Mâles, tués en Nov. 1865, Boné, v. Rosenberg. — 4,
5. Femelles, tuées en Avril 1864, Toulabello, v. Rosenberg. —
- 6, 7. Mâle et femelle, tués en Mai 1864, Toula-bello, von Rosenberg. — 8. Mâle, Menado, prés. en 1865 par Jonkh. R. v. Duyvenbode.

b. Trois doigts.

DACELO RUFIDORSA. L. c. p. 48. — C. Sharpei, Salvadori.
Point de bleu sur les parties supérieures.

Observé dans les îles de Java, Bornéo et Sumatra.

Ajoutez: 10. Adulte, Java, Junghuhn, 1864. — 11. Adulte, Java, 1870.

Trois squelettes de Java.

²⁰² **DACELO MELANURA.** L. c., p. 49.

Dessus brun-rouge. Ailes noires, mais aux couvertures pointillées de bleu. Une tache bleue en arrière de la région auriculaire.

Habite les Philippines.

1. Adulte, Philippines. — 2. Mâle adulte, Philippines, 1865. — 3. Adulte, Philippines, 1869.

¹⁰² **DACELO DILLWYNNI.** — Ceyx Dillwynii, Sharpe.

Observé à Bornéo.

1. Adulte, Bornéo, 1864.

¹⁰² **DACELO TRIDACTYLA.** ^{Tall.} — Dacelo rubra l. c., p. 49. — Ceyx rufidorsa, Sharpe, Alced., p. 121, pl. 41.

Manteau bleu dans les adultes, noir dans les jeunes.

1. Mâle, Sumatra, S. Müller. — 2. Jeune individu. — 3. Jeune, 1866. — 4. Individu au plumage très parfait, sans tache bleue derrière l'oreille. *Coll. L. de S. de 1866*

DACELO LEPIDA. L. c., p. 48. — *Ceyx lepida*, Temm. — *Ceyx uropygialis*, Gray, Sharpe, p. 155, pl. 47.

Observé, par nos voyageurs, à Morotai, Ternate, Batjan, Obi-major, Amblaou, Céram, Amboine, Matabello, et à la Côte Ouest de la Nouv. Guinée (Lobo).

Ajoutez: 20, 21. Mâle et femelle, tués le 12 Oct. 1862, Ternate, Bernstein. — 22. Femelle, tuée le 21 Janvier 1865, île d'Amblaou, au Sud de Bouro, Hoedt. — 25. Adulte, 1868, Amboine. — 24. Mâle, tué le 24 Janvier 1867, Amboine, Hoedt. — 25, 26. Mâle et femelle, tuées le 22 Févr. 1867, Amboine, Hoedt. — 27. Femelle, tuée le 9 Mars 1866, Amboine, Hoedt. — 28. Femelle, tuée le 4 Juin 1864, Amboine, Hoedt. — 29. Femelle, tuée le 2 Août 1865, Amboine, Hoedt. — 30. Femelle, tuée le 29 Nov. 1865, Amboine, Hoedt. — 31, 32, 33. Mâles, Amboine, Hoedt, 1863. — 34, 35, 36. Femelles, Amboine, Hoedt, 1863. — 37. Femelle, tuée le 25 Juillet 1862, Obi-major, Bernstein. — 38, 39. Mâle et femelle, tués le 8 Sept. 1865, île de Matabello, von Rosenberg.

DACELO WALLACEI. — *Ceyx Wallacei*, Sharpe.

Patrie: le groupe de Soula.

1. Mâle, tué le 5 Déc. 1864, Soula Mangola, Hoedt. — 2, 3. Mâles, tués en Janvier 1864, Soula-Bessie, Bernstein. — 4, 5. Mâle et femelle, tués en Févr. 1864, Soula-Bessie, Bernstein.

DACELO CAJELI. — *Ceyx cajeli*, Wallace.

Patrie: l'île de Bouro.

1. Mâle, tué le 2 Déc. 1864, Bouro, Hoedt. — 2, 3. Femelles, tuées en Déc. 1864, Bouro, Hoedt.

TANYSIPTERA.

TANYSIPTERA DEA. *Dacelo dea* et *sabrina*, L. c., p. 45 et 46. Voir mon mémoire sur cette espèce dans le Nederl. Tijdschrift v. Dierkunde, vol. 3, p. 269.

Nous comprenons sous ce nom général des oiseaux tués dans vingt et une localités différentes. Tous ces oiseaux s'accordent entre eux, au plumage imparfait, par leurs teintes et leur distribution. Les adultes présentent, il est vrai, dans quelques localités, certaines différences; mais il existe tant de variations intermédiaires que l'on ne saurait fixer des caractères précis pour chacune de ses formes, dont on a érigé quelques unes au rang d'espèces. Ayant déjà traité ce sujet amplement et à plusieurs reprises, je me borne aujourd'hui à indiquer, dans ce catalogue, les principaux faits qui peuvent servir de base aux études subséquentes à entreprendre sur de plus amples collections que celles dont on peut disposer pour le moment.

Individus de la baie Lobo ou Triton à la Côte occidentale de la Nouv. Guinée. — Aile 4 pouces. Queue 11 pouces 7 lignes. — 1, 2, 3. Ce sont les N^o. 7, 8, 9 du Catal. de 1864. Desus de la tête et épaules d'un vert bleuâtre; manteau et scapulaires noirs.

4. Femelle adulte de Sorong, à la Nouv. Guinée en face de Salawattie, tuée le 11 Déc. 1864: aile 3 pouces 10 lignes, queue 8 pouces; dessus de la tête et épaules d'un bleu de cobalt argenté, manteau et scapulaires lavés de bleu de cobalt.

5. Individu mâle, tué au hâvre Dorey le 8 Janvier 1869, v. Rosenberg. Aile 3 pouces 10 lignes; queue 8 pouces 11 lignes. Teintes intermédiaires entre celles des individus de Lobo et Sorong.

Individus d'Andaï, au Sud de Dorey. Teinte du dessus de la tête tirant tantôt au bleu, tantôt au vert. Manteau et scapulaires d'un bleu de cobalt très foncé. Aile 3 pouces 10 à 11 lignes; queue 9 pouces 10 lignes à 14 pouces 4 lignes. — 6, 7. Mâles adultes, tués le 4 Mars 1870, von Rosenberg. — 8. Mâle adulte, tué le 26 Févr. 1870, v. Rosenberg. — 9. Mâle dans la livrée de passage, tué le 4 Mars 1870. — 10. Jeune mâle, tué le 3 Mars 1870, von Rosenberg. — 11. Jeune femelle, tuée le 5 Juin 1869, von Rosenberg.

Individus de l'île de Waaighéou. *Tanysiptera galatea*, J. E.

Gray. — Aile 5 pouces 11 lignes à 4 pouces, Queue 8 à 9 pouces. Teintes comme dans les individus d'Andaï. — 12, 15. Mâles, tués en Mars 1865, Bernstein. — 14, 15, 16, 17. Femelles, tuées en Mars 1865, Bernstein. — 18, 19. Mâle et femelle, tués en Avril 1865, Bernstein.

Individus de l'île de Batanta. Aile 5 pouces 9 lignes à 4 pouces. Queue 9 pouces 3 lignes à 10 pouces 4 lignes. Teintes comme dans notre individu de Sorong. — 20. Mâle, tué le 4 Avril 1865, Bernstein. — 21. Mâle, tué le 2 Juillet 1869, v. Rosenberg.

Individus de l'île de Salawattie. — Teintes comme dans les individus de Sorong. Aile 5 pouces 11 lignes à 4 pouces 1 ligne. Queue 9 pouces 6 lignes à 12 pouces. — 22, 23, 24. Mâles, tués en Mars 1865, Côte Nord, Bernstein. — 25, 26. Femelles, tuées en Mars 1865, Côte Nord, Bernstein. — 27, 28. Mâles, tués le 21 Juin 1869, v. Rosenberg.

29. Femelle, tuée à Guebéh, le 18 Mai 1865, Bernstein. Teinte du dessus de la tête tirant fortement au vert; aile 5 pouces 10 lignes; queue 8 pouces 1 ligne.

30. Mâle adulte, Bouro, Hoedt, 1867. Teintes comme dans les individus de Salawattie. Aile 4 pouces. Queue 8 pouces 6 lignes. Notez que l'oiseau dans la livrée imparfaite tué à Bouro a été introduit par Wallace sous le nom de *Tansyiptera acis*.

31. Femelle tuée à Manipa, île située entre Bouro et Céram, Hoedt, 1865: teintes comme dans l'individu de Bouro, mais le dessus de la tête tirant un peu plus fortement sur le bleu. Aile 4 pouces; queue 5 pouces 9 lignes.

Individus de Boano, île située au Nord-Est de Manipa. Teinte du dessus de la tête et des épaules tirant très fortement sur le vert et cette teinte se répandant également sur le manteau; particularité propre, à ce qu'il paraît, aux individus de cette petite île. Aile 5 pouces 11 ligne à 4 pouces. Queue 9 pouces 2 lignes. — 52, 53. Mâle et femelle adultes, Hoedt, 1865. — 54. Jeune femelle, Hoedt, 1863.

Individus d'Amboine. — *Tansyiptera naïs*, Gray. — Parfait-

tement semblables à celui de Sorong, mais au vert des épaules un peu plus clair et au bleu du manteau plus vif. Aile 3 pouces 11 lignes à 4 pouces 2 lignes. Queue 8 à 10 pouces. — 35. Mâle adulte, 1862: c'est N^o. 1 du Cat. de 1863. — 36. Jeune femelle, Forsten: c'est le N^o. 2 du Catal. de 1863. — 37. Mâle adulte, tué le 11 Mars 1866, Hoedt. — 38. Mâle au plumage imparfait, tué le 17 Mars 1866, Hoedt. — 39. Mâle adulte, tué le 25 Avril 1866, Hoedt. — 40, 41. Femelles adultes, tuées en Avril 1866, Hoedt. — 42. Femelle adulte, tuée le 1 Août 1866, Hoedt. — 43. Mâle au plumage à-peu-près parfait, tué le 10 Nov. 1863, Hoedt. — 44, 45. Mâles adultes, Hoedt, 1863. — 46. Femelle adulte, Hoedt, 1863.

Individus de Céram. — Teintes comme dans les individus d'Amboine, mais l'un de nos adultes, le N^o. 38, a le dessus de la tête tirant aussi fortement au vert que dans l'individu de Guebéh. Aile 3 pouces 11 lignes. Queue 7 à 10 pouces. — 47. Mâle, tué le 19 Avril 1863, Hoedt. — 48. Mâle adulte: c'est le N^o. 3 du Catal. de 1863. — 49, 50, 51: ce sont les N^{os}. 4, 5 et 6 du Cat. de 1863.

Individus de l'île de Monawolka située à l'Est de Céram. Teintes rappelant celles des individus de Céram, mais au bleu du manteau beaucoup plus répandu et plus pur. Aile 4 pouces 1 ligne à 4 pouces 2 lignes. Queue environ de 8 pouces. — 52, 53. Mâles, tués au milieu du mois de Sept. 1865, von Rosenberg. — 54, 55. Femelles, tuées au milieu de Sept. 1865, von Rosenberg.

Individus de l'île de Halmahéra. *Tanyptera Margarethae*, Heine. Taille un peu moins forte que d'ordinaire. Dessus de la tête d'un bleu tirant, dans les adultes, vers ses bords latéraux et postérieur au vert; épaules offrant également cette dernière teinte. Manteau noir, lavé plus ou moins sensiblement de bleu. Aile 3 pouces et 4 à 10 lignes. Queue 5 pouces 6 lignes à 7 pouces 9 lignes. — 56, 57. Mâle et femelle tués le 22 Avril 1862, Dodingo, Bernstein. — 58, 59, 60. Mâles, tués en Nov. 1861, Dodingo, Bernstein. — 61. Femelle,

tuée le 5 Nov. 1861, Dodingo, Bernstein. — 62. Femelle, tuée le 27 Nov. 1861, Kaou, Bernstein. — 63. Mâle, tué le 18 Nov. 1862, Bessa, Bernstein. — 64, 65. Femelle, tuée le 19 Nov. 1862, Bessa, Bernstein. — 66. Mâle, tué le 10 Juillet 1861, Galéla, Bernstein. — 67. Jeune individu commençant à revêtir la livrée parfaite, Dodingo, v. Rosenberg, 1870. — 68. Jeune mâle, tué le 25 Oct. 1862, Dodingo, Bernstein. — 69. Jeune mâle, tué le 16 Nov. 1861, Dodingo, Bernstein. — 70. Jeune mâle, tué le 11 Janvier 1862, Bessa, Bernstein. — 71. Jeune femelle, tuée le 11 Nov. 1862, Bessa, Bernstein. — 72. Jeune femelle, tuée le 28 Nov. 1861, Kaou, Bernstein. — 73. Jeune femelle, tuée le 11 Juin 1863, Weda, Bernstein. — 74. Très jeune mâle, tué le 17 Juillet 1861, Galéla, Bernstein. — 75, 76, 77. Adultes; Dodingo, v. Rosenberg, 1870. — 78. Individu à-peu-près adulte, au bleu de la tête et des épaules presque uniforme.

Individus de Batjan, tous recueillis par feu Bernstein. — Semblables à ceux de Halmahéra. — 79. Mâle, tué le 4 Janv. 1861. — 80, 81. Mâles, tués en Févr. 1861. — 82, 83. Femelles, tuées en Févr. 1861. — 84. Femelle, tuée en Mars 1861. — 85. Mâle, tué le 16 Sept. 1863. — 86. Mâle, tué le 29 Déc. 1861. — 87. Femelle, tuée le 31 Déc. 1860. — 88. Femelle, au plumage à-peu-près parfait, 1862. — 89, 90. Jeunes mâles, tués en Février 1861. — 91. Jeune, tué le 29 Déc. 1861.

Individus du groupe d'Obi, tous recueillis par feu Bernstein. — Taille forte. Dessus de la tête et épaules d'un bleu de cobalt uniforme et ne tirant au vert que dans l'un de nos individus. Manteau d'un noir lavé de bleu. Bleu de la queue ne tirant pas non plus sur le vert. Aile 4 pouces à 4 pouces 2 lignes. Queue 7 pouces 6 lignes à 8 pouces 2 lignes. — 92, 93. Mâles, tués en Juillet 1862, Obi-major. — 94, 95. Femelles, tuées en Juillet 1862, Obi-major. — 96. Femelle, tuée le 14 Juillet 1862, Obi-major: le bleu du milieu de l'occiput changé au blanc. — 97, 98. Jeunes mâles, tués au milieu de

Juillet, Obi-major. — 99. Mâle, tué le 14 Août 1862, Obi-lattou; avec une plume en partie blanche au côté de l'occiput. — 100, 101. Femelles, tuées en Août 1862, Obi-lattou. — 102. Jeune mâle, tué le 13 Août 1862, Obi-lattou. — 103, 104, 105, 106, 107, 108. Jeunes femelles, tuées en Août 1862, Obi-lattou.

^{inca, Gray} Individus de l'île de Kajoa tous recueillis par Bernstein. *Tany-
siptera sabrina*, J. E. Gray. Teintes rappelant celles des individus d'Obi; mais avec une ou plusieurs plumes bleues du manteau changées au blanc dans le plus grand nombre d'individus, et de taille moins forte. Aile 5 pouces 8 lignes à 4 pouces. Queue 5 pouces 6 lignes à 6 pouces 10 lignes. — 109, 110. Adultes à manteau sans plumes blanches, tués en Août 1864. — 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Adultes avec une ou deux plumes blanches au manteau, tués en Août 1864. — 119, 120, 121, 122. Adultes, avec plusieurs plumes blanches au manteau, tués en Août 1864. — 123. Adulte, tué en Août 1864: presque toutes les plumes de la partie postérieure du manteau blanches.

^{Moll} Individus de Morotaï, tous recueillis par Bernstein. — *Tany-
siptera doris*, Wallace. — Teintes du dessus de la tête d'un beau vert aigue-marine, comme dans les individus de Guebéh et d'Andaï. Épaule d'un bleu tirant, au milieu, plus ou moins sensiblement sur le au vert. Bleu de la partie postérieure du manteau changé plus ou moins sensiblement au blanc, absolument comme cela a lieu dans les individus de Kajoa. Aile 3 pouces et 6 à 10 lignes; queue 5 pouces 6 lignes à 6 pouces 8 lignes. — 124 à 157: quatorze individus; ce sont *Dacelo sabrina*, Nos 2 à 15 du Catal. de 1865.

<sup>cat.
14.</sup> Individus de l'île de Raou, tous recueillis par Bernstein. — *Tany-
siptera Emiliae*, Sbarpe. — Ne diffèrent guère de ceux de Morotaï que par les épaules teintes plus fortement de vert. Aile 3 pouces et 8 à 11 lignes; queue 7 à 8 pouces. — 158 à 145: six individus; ce sont *Dacelo sabrina*, Nos 16 à 21 du Catal. de 1863. — 144. Adulte en mue, 1862.

Individus de l'île de Koffiaou. — *Tanysiptera Elliotii*, Sharpe. — C'est à tort que M. Sharpe fait venir cet oiseau de Misool, aucun des voyageurs qui ont parcouru cette île n'y ayant rencontré une espèce quelconque de Tanysiptère. Le fait est que tous les échantillons de ce conspécies connus des naturalistes jusqu'à ce jour, savoir ceux de notre collection et celui du Cabinet Turati, ont été recueillis par notre voyageur M. Hoedt dans l'île de Koffiaou, située dans le voisinage de Misool. Ces individus rapellent par leurs teintes ceux de Salawattie et Waai-ghéou; mais c'est le blanc qui domine plus ou moins complètement dans les pennes caudales, et les rectrices mitoyennes offrent quelquefois, dans leur partie moyenne, plus de largeur que d'ordinaire. Aile 5 pouces 10 lignes à 4 pouces 2 lignes; queue 7 pouces 6 lignes à 8 pouces 10 lignes. — 145, 146. Mâles à queue blanche, tués en Juillet 1867. — 147, 148, 149. Femelles à queue blanche, tuées en Juillet 1867. — 150, 151. Mâle et femelle, avec un reste de noirâtre ou de vert le long de la partie centrale des rectrices mitoyennes, tués en Juillet 1867. — 152, 153. Mâle et femelle au vert des rectrius plus prononcé, tués en Juillet 1867. — 154. Femelle, tuée en Juillet 1867: partie centrale des rectrices mitoyennes verte et étroite. — 155. Femelles au plumage à-peu-près parfait, offrant toutes les rectrices d'un bleu verdâtre uniforme.

156. Squelette, Lobo, S. Müller.

TANYSIPTERA RIEDELI, Verreaux. — *Tanys. Schlegelii*, v. Rosenberg in litt., dans Schlegel, Obs. zool. IV, dans le Nederl. Tijdschr. v. Dierkunde, 4, p. 12.

Patrie: l'île de Soëk, où tous nos individus ont été recueillis en Mars 1869 par M. von Rosenberg. Notez que cet oiseau indiqué par Verreaux comme provenant de Célèbes, ne vient pas de cette île où il n'existe pas des Tanysiptères. — Très caractérisé, et même dès la première livrée, par le beau vert aigue-marine argenté occupant le dessus de la tête et du cou, le manteau, les couvertures alaires, les freins et la région

des oreilles. — Aile 3 pouces 7 lignes à 3 pouces 10 lignes; queue 6 pouces 6 lignes à 9 pouces 6 lignes. — 1, 2, 3, 4, 5; 6. Mâles adultes. — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Femelles adultes. — 14. Jeune Femelle. — 15. Très jeune femelle.

TANYSIPTERA HYDROCHARIS. G. R. Gray. Voir *Dacelo hydrocharis*, Cat. 1863, p. 46.

Remplace, dans le groupe d'Arou, la *Tanysiptera dea*, qu'elle rappelle vivement; mais elle est considérablement plus petite, et toutes les couvertures alaires sont d'un bleu de cobalt foncé et terne. Le dessus de la tête offre cette même teinte, mais elle est encore moins vive et passe au bleu plus clair sur le dessus de la région des oreilles, laquelle est noire. — Aile 3 pouces à 5 pouces 3 lignes; queue 6 pouces 6 lignes à 7 pouces 8 lignes.

Ajoutez: 3, 4. Mâles, tués en Mai 1865, Wonoumbaï, von Rosenberg. — 5, 6, 7. Femelles, tuées en Mai 1865, Wonoumbaï, von Rosenberg. — 8, 9. Mâles, tués en Juin 1865, Wonoumbaï, von Rosenberg. — 10. Femelle, tuée le 28 Juillet 1865, Wonoumbaï, v. Rosenberg. — 11. Jeune mâle, tué le 1 Juin 1865, Wonoumbaï, v. Rosenberg. — 12, 13. Très jeunes mâles, tués le 17 Mai 1865, Wonoumbaï, von Rosenberg. — 14. Très jeune femelle, tuée le 17 Mai 1865, Wonoumbaï, v. Rosenberg.

TANYSIPTERA NYMPHA, Gray.

Espèce rare, très belle et plus particulièrement caractérisée, à l'âge adulte, par son dos, son croupion et le dessous du corps teints d'un beau rouge clair, plus pâle sur la gorge.

Observé à Sorong, intérieur de la Côte Nord-Ouest de la Nouv. Guinée.

1. Femelle adulte, tuée le 6 Février 1865, Sorong, Bernstein: aile 3 pouces 4 lignes; queue 5 pouces.

TANYSIPTERA CAROLINAE, von Rosenberg, in litteris; voir

Schlegel, Obs. zool. IV dans le Nederl. Tijdschr. v. Dierkunde, 4, p. 13.

Belle espèce rappelant, par sa taille et ses formes, la *Tanys*.
 dea; mais se distinguant de celle-ci et de toutes les autres con-
 nues: à l'âge adulte, par ses parties inférieures teintées du même
 bleu foncé qui occupe la tête, le cou, le manteau et les ailes;
 au jeune âge, par son dessous d'un roux varié de noir. Dé-
 couverte par M. von Rosenberg, qui a recueilli tous les individus
 de notre collection.

Aile 5 pouces 10 lignes à 4 pouces 2 lignes; queue 6 pou-
 ces à 7 pouces 5 lignes.

Observé nulle part que dans l'île de Méfoor, située dans la
 baie de Geelvink à l'Est du hâvre Doréh.

1, 2, 3, 4, 5. Mâles adultes, tués en Janvier 1869. —
 6, 7, 8. Mâles adultes, tués en Février 1869. — 9, 10. Mâles
 adultes, tués le 1 Mars 1869. — 11, 12, 13, 14, 15, 16.
 Femelles adultes, tuées en Janvier 1869. — 17, 18, 19. Fe-
 melles adultes, tuées en Février 1869. — 20. Femelle au plu-
 mage à-peu-près parfait, tuée le 25 Janvier 1869. — 21. Très
 jeune femelle, à queue très peu développée, mais au bleu du
 dessous commençant à se répandre fortement, tuée le 21 Févr.
 1869. — 22. Jeune femelle, tuée le 10 Févr. 1869. — 23.
 Jeune femelle, tuée le 27 Janvier 1869. — 24. Jeune mâle,
 tué le 30 Janvier 1869. — 25. Jeune mâle, tué le 1 Févr.
 1869. — 26. Petit, pris du nid le 24 Févr. 1869.

TANYSIPTERA SYLVIA. — *Dacelo sylvia*, Cat. 1863, p. 47.
 Ajoutez: 2, 5. Adultes, Cap York, 1867. — 4. Adulte,
 Cap York, 1870. — 5. Mâle adulte, Cap. York, 1875. — 6.
 Adulte, Port Albany, 1867.

RÉSUMÉ.

	Page.	Ind. mont.	Squel.	Crân.
<i>Alcedo guttata</i> , Nipaul.	1	4		
" <i>lugubris</i> , Papou.	1	2		
" <i>rudis</i> , Afrique australe, Côte d'or, Sennaar, Nubie, Egypte. Eur. mér., Syrie, Chine.	1	19		1
" <i>maxima</i> , Afr. austr. Côte d'or, Sénégal, Abyssinie.	1	13		
" <i>torquata</i> , Brésil, Surinam, Caracas, Haïti.	1	7		
" <i>alcyon</i> , Amér sept. (Wisconsin, Ohio), Cuba, Haïti,	2	8		
" <i>amazona</i> , Brésil, Surinam, Bogotà, Nouv. Grenade.	2	9		
" <i>americana</i> , Brésil, Guyane, Tejas, Oyapock.	2	11		
" <i>Cabanisii</i> , Mejico, Costa rica.	2	8		
" <i>viridirufa</i> , Surinam, Oyapock, Brésil.	2	13	1	1
" <i>supercilliosa</i> , Cayenne, Surinam, Côte ferme.	2	9		
" <i>ispida</i> , Hollande, Angletterre, Portugal, Silésie, Syrie.	2	12	1	1
" <i>minor</i> , Nubie, Nipaul, Hindoustan, Bengale, Ceylan, Emoy et Cantou en Chine, Japon, Philippines, Formosa, Sanghir, Sumatra, Timor.	3	49		
" <i>minor moluccensis</i> , Célèbes, Soula, Bouro, Amblaou, Halmahéra, Batjan, Obi, Céram, Amboine, Goram.	3	46	1	
" <i>meninting</i> , Java, Bangka, Bornéo, Célèbes.	5	19	1	
" <i>quadribrachys</i> , Côte d'or.	5	1		
" <i>semitorquata</i> , Afrique australe, Abyssinie, Gaboun.	5	8		
Transport		238	4	3

	Pagc.	Ind. mont.	Squel.	Crân.
Transport	238		4	3
<i>Alcedo euryzona</i> , Java, Sumatra.	5	5		
" <i>beryllina</i> , Java.	6	9		
<i>na</i> " <i>cristata</i> , Cap, Cafrérie, Mossamides, Bissao,				
Abyssinie, Bahr et Ghazal.	6	18		
" <i>coeruleocephala</i> , Côte d'or, Ilho do Principc.	6	3		
<i>ta</i> " <i>vintsioides</i> , Madagascar, Mayotte.	6	8		
<i>leucocephala</i> , Nipaul, Ceylan, Malacca, Siam,				
Sumatra, Bangka, Java, Bornéo.	7	32	4	
" <i>amauroptera</i> , Sumatra, Irawaddi.	1	3		
" <i>melanorhyncha</i> , Célèbes, Soula.	8	13		
" <i>leucogaster</i> , Côte d'or, Fernando-Po.	8	2		
" <i>picta</i> , Côte d'or, Abyssinie.	8	6		
" <i>natalensis</i> , Cafrérie, Abyssinie.	8	5		
" <i>Lecontei</i> , Côte d'or.	9	1		
" <i>azurea</i> , Tasmanie, Australie jusqu' au port Essington et au Cap York, (Arou, Wallace) Nouv. Guinée (Lobo, Andai), île de Soëk dans la baie de Geelvink, Halmahéera Batjan, Céram.	9	22		
" <i>solitaria</i> , Nouv. Guinée (Lobo, Sorong, Dorey, Andai), Salawattie, Batanta, Misool, Arou.	9	20		
" <i>pusilla</i> .	10	12		
" <i>cyanipectus</i> , Philippines.	11	3		
		400	8	3
<i>Dacelo gigas</i> , Australie mér.	11	10		
" <i>cervina</i> , Australie (Port Essington, Port Albany).	11	5		
" <i>Leachii</i> , Australie (Port Essington).	11	2		
" <i>Gaudichaudii</i> , Arou, Misool, Salawattie, Batanta, Waaighéou, Nouv. Guinée (Lobo, Seléh, Sorong, Doréh, Andai), groupe de Geelrink (Méosnoum et Iobie).	11	53		
" <i>tyro</i> , Arou.	13	11		
" <i>pulchella</i> , Sumatra, Java.	13	5	1	
Transport	86		1	

	Page.	Ind. mont.	Squel.	Grân.
Transport . . .	86		1	
" melanops, Bornéo.	13	2		
" macrorhina, Nouv. Guinée (Dorey, Andax), Misool, Waaighéou.	13	8		
" cyanotis, Célèbes.	14	11		
" sanghirensis, ile de Grand-Sanghir.	14	8		
" Lindsayi, Philippines.	15	2		
" torotoro, Nouv. Guinée (Lobo, Sorong, Do- rey, Andax) Jobie, Waaighéou, Salawattie, Misool, Arou, Cap York (Gould).	15	27		
" princeps, Célèbes.	16	17		
" fulgidus, Lomboek, Flores.	16	2		
" coromanda, Japon, Philippines, Grand Sang- hir, Siao, Célèbes, Soula, Java, Bornéo, Sumatra, Bangka.	16	26	2	1
" concreta, Bornéo, Sumatra, Malacca.	18	5	2	
" pileata, Philippines, Chine, Cochinchine, Su- matra, Bornéo.	18	5		
" cyaniventris, Java.	18	9	1	
<i>26 n. l.</i> fusca, Smyrne, Syrie, Nipaul, Hindoustan, Bengale, Ceylan, Chine.	18	15		
" gularis, Philippines.	19	3		
" badia, Gaboon.	19	1		
" semicoerulea, Abyssinie, Canaries, Sénégal, ile St. Jago du Cap vert.	19	11		
" cinereifrons, Sénégal, Bissao.	20	3		
" malimbica, Côte d'or.	20	4		
" dryas, Iles du Cap vert.	20	6		
" senegalensis, Sénégal, Côte d'or, Gaboon, Abyssinie.	21	8		
" albiventris, Afrique Australie.	21	9		
" chelicuti, Abyssinie, Sénégal, Cafrérie.	21	10	1	
" chloris, Abyssinie, Poulo-Pinang, Cochin- chine, Philippines, (Pelew), Bornéo, Su- matra, Bangka, Java, Siao, Célèbes, Soula-Bessie, Halmahéra, Ternate, Tidore,				
Transport . . .	278	7	1	

	Page.	Ind. mont.	Squel.	Crân.
Transport		278	7	1
Maréh, Batjan, Morotai, Obi, Bouro, Amblaou, Amboine, Manipa, Céram, Poulo- Padjan, Monawolka, Koor, Petit-Key, Grand-Key, Banda, Flores, Timor, Lettie, Misool, Salawattie, Gagie, Nouv. Guinée (Outansta), Arou et (Australie sept.)	21	131	4	
Dacelo sancta, Bangka, Bornéo, Célèbes, Siao, Soula-Mangola, Halmahéra, Ternate, Maréh, Batjan, Obi, Dammar, Bouro, Amboine, Céram, Goram, Poulo-Padjan, Banda, Arou, Misool, Salawattie, Waaighéou, Méosnoum, Jobie, Nouv. Guinée (pointe Sud-Ouest), Australie, Nouv. Calédonie.	26	70		
" vagans, Nouv. Zélande.	28	7		
" pyrrhopygia, Australie.	28	2		
" sacra, Tonga, Fidji, Nouv. Hébrides.	28	6		
" tuta, Taïti, Marquises.	29	5		
" recurvirostris, Samoa.	29	4		
" cinnanomina, Mariannes.	29	3		
" Reichenbachii, Ile Pelew.	29	3		
" coronata, Timor, Wetter.	30	4		
" funebris, Halmahéra.	30	12		
" Maclayi, Australie sept.	30	6		
" diops, Halmahéra, Ternate, Tidore, Motir, Batjan, Dammar, Obi-lattou, Morotai.	30	36		
" lazuli, Céram, Amboine, Harouko.	31	16		
" nigrocyanea, Salawattie, Sorong, Andai.	31	19		
" albicilla, Morotai, Batjan, Dammar, Obi- major, Moor, Guebéh, Waaighéou, Sala- wattie, Misool, Sorong, Dorey, Méfoor, Soék.	32	27		
" madagascariensis, Madagascar.	32	4		
" fallax, Célèbes.	32	8		
" rufidorsa, Java, Bornéo, Sumatra.	33	8	3	
" melanura, Philippines.	33	3		
Transport		652	14	1

	Page.	Ind. mont.	Squel.	Crân.
Transport		652	14	1
Dacelo Dillwynni, Borneo.	33	1		
" tridactyla, Sumatra.	33	4		
" lepida, Morotaï, Ternate, Batjan, Obi-major.				
Amblaou, Céram, Amboine, Matabello,				
Nouv. Guinée (Lobo).	34	39		
" Wallacei, Soula.	34	5		
" cajeli, Bouro.	34	3		
		<u>704</u>	<u>14</u>	<u>1</u>
Tanysiptera dea, Nouv. Guinée (Lobo, Sorong, Dorey, Andaï), Waaighéou, Batanta, Salawattie, Guebéh, Bouro, Manipa, Boano, Amboine, Céram, Monawolka, Halmahéra, Batjan, Obi, Kajoa, Mo- trotai, Raou, Koffiaou.	34	155	1	
" Riedeli, Soëk.	40	15		
" hydrocharis, Arou.	41	14		
" nympa, Nouv. Guinée (Sorong).	41	1		
" Carolinae, île de Méfoor.	41	26		
" sylvia, Presqu'île de York (Australie).	42	6		
(11)		<u>217</u>	<u>1</u>	

RÉCAPITULATION.

Alcedo.	400	8	3
Dacelo.	704	14	1
Tanysiptera.	217	1	
Total 1335 échantillons . . .	<u>1321</u>	<u>23</u>	<u>4</u>