

NOTE XXXV.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU GENRE
ECTATORHINUS
(COLEOPTERA: fam. CURCULIONIDAE).

PAR

W. ROELOFS.

Monsieur Neervoort van de Poll ayant reçu récemment avec d'autres insectes une nouvelle espèce d'*Ectatorhinus*, capturée dans l'intérieur de Bedagei (Deli, Sumatra orient.) par M. J. Z. Kannegieter, m'a invité de la décrire, ce que je fais avec d'autant plus de plaisir que j'avais décrit dans le temps une autre espèce du genre ¹⁾ provenant de la même île que la nouvelle espèce qui est bien distincte des autres et d'une forme remarquable. J'ai conservé le nom que M. van de Poll lui a donné et qui est parfaitement bien choisi.

Ectatorhinus alatus v. d. Poll, in litt.

D'un noir-brunâtre; dessus peu densément garni d'écaillles brunes, dessous couvert de poils brun-jaunâtres. Elytres pourvues derrière les épaules d'une lame saillante, dénudée. — ♂. Long. 12 millim. rostr. excl.

D'une forme moins massive que les autres espèces du genre; d'un noir-brunâtre; le dessus garni d'écaillles brunes.

Rostre moins long que la moitié du corps, sa moitié postérieure garnie d'écaillles, pourvue d'une carène médiane, accompagnée de chaque côté de deux carènes obsolètes; sa moitié antérieure lisse et dénudée. — Antennes insérées un peu en arrière du milieu, leur scape restant éloigné des

1) *Ectatorhinus Hasseltii* Roelofs, Notes from the Leyden Museum. Vol. II (1880) p. 231; — Deutsche Entomologische Zeitschrift. Bd. XXIV (1880) p. 141; — Midden-Sumatra. Coleoptera. p. 117.

yeux; articles du funicule subégaux, garnis d'écailles et de poils de la même couleur; massue d'un brun-noirâtre velouté.

Prothorax peu élargi sur les côtés, portant une carène lisse médiane et des rainures longitudinales séparées par des côtes élevées; les deux côtes ou carènes de chaque côté de la carène centrale sont au milieu plus élevées que les autres. — Les bords latéraux du prothorax portent des écailles d'un brun-jaunâtre et une petite ligne blanche se divisant en deux rameaux en avant. — Sur le disque du prothorax on distingue quelques écailles blanches sur une ligne transversale. — Ecusson ovale, allongé, dénudé.

Élytres peu élargies sur les côtés, graduellement rétrécies en arrière, munies de stries de gros points; les intervalles des stries étroits. L'intervalle à côté de la suture moins élevé que les autres, le troisième portant trois protubérances dentiformes rapprochées; le cinquième intervalle porte un peu au delà du milieu un tubercule moins apparent et sur la déclivité postérieure se voit une pointe encore moins élevée. — Derrière l'épaule des élytres se trouve une grande lame saillante dépourvue d'écailles. — Vers le milieu de la suture se voit une tache d'un brun clair veloutée, suivie d'une tache noire; on distingue des écailles blanches à la base et sur la face antérieure de la dernière dent du troisième intervalle, une petite tache de la même couleur sur le septième intervalle vers le tiers postérieur et quelques gouttelettes sur les bords et le bout des élytres.

Le dessous est couvert de poils brun-jaunâtres, assez longs sur le metasternum.

Les pattes sont décorées d'anneaux blancs, plus ou moins en zigzag. — Les hanches antérieures se prolongent dans une pointe un peu recourbée.

L'élargissement en forme de plaque ou lame dénudée derrière l'épaule des élytres constitue le caractère le plus distinctif de l'espèce.