

## NOTE XIX.

DESCRIPTION DE TROIS ESPÈCES D'ÉLATÉRIDES  
NOUVEAUX DU MUSÉE DE LEYDE

PAR

E. CANDÈZE.

*Campsosternus Hasselti*, n. sp.

*Viridis igneo-micans, subhebetatus, glaber; antennis nigris; prothorace trapeziformi, parum convexo, disco æquali, medio tantum punctato, linea obsoleta media, angulis posticis tumidis, haud carinatis; elytris brevibus, a basi attenuatis, punctato-substriatis, interstitiis rugulosis; subtus, cum pedibus, aurato-viridis.* — Long. 26 mill., lat. 9 mill.

*Hab.* Sumatra occ.: Tapanoeli (A. L. van Hasselt). — Un seul exemplaire.

Cette espèce glabre, assez petite pour le genre, à pattes de couleur métallique, a de grands rapports avec le *C. Plutus* de Bornéo dont il a la forme trapézoïde du prothorax, ainsi que l'aspect un peu mat. Mais il en diffère par le manque d'impressions sur ce même prothorax, les angles postérieurs bombés mais non carénés.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux est remarquable par un reflet rouge, qui ne paraît que dans certaines positions de l'insecte, comme chez le *C. flammeus*, mais qui est plutôt terne que brillant.

*Megapenthes natunensis*, n. sp.

*Castaneus, haud nitidus, brevissime pubescentia sericea obductus; antennis fusco-nigris, basi rufescentibus; prothorace latitudine longiore, creberrime æqualiter punctato, angulis posticis longe unicarinatis; elytris punctato-striatis, intersti-*

Notes from the Leyden Museum, Vol. XVI.

*tiis convexis, rugulosis, brunneis, basi dilutioribus; epipleuris pedibusque flavis.* — Long. 8 mill., lat.  $2\frac{1}{3}$  mill.

*Hab.* Iles Natuna, dans le golfe de Chine (A. L. van Hasselt). — Un seul exemplaire.

Voisin du *M. saleyeri*<sup>1)</sup> (*agriotides* olim), presque de même couleur bien qu'un peu plus rougeâtre sur les élytres, qui sont en outre marquées à la base d'un point jaunâtre; les angles postérieurs du prothorax ne portent qu'une seule carène, mais qui est longue; la pubescence qui recouvre les élytres a un reflet grisâtre à la suture et au bord externe.

*Melanotus diploconoides*, n. sp.

*Brunneo-castaneus, subdepressus, pubescens; antennis articulo tertio quarto multo minore; prothorace trapeziformi, latitudine haud longiore, parum convexo, punctato, medio linea impressa, angulis posticis longe carinatis, sulcis basilibus magnis; elytris punctato-striatis, striis basi fortiter impressis; subtus concolor.* — Long. 11—16 mill., lat.  $3-4\frac{1}{2}$  mill.

*Hab.* Sumatra occ. — L'exemplaire du Musée de Leyde (une femelle) provient du Mt. Loeboe Raja et a été offert au Musée par M. A. L. van Hasselt.

Voisin du *M. cuneolus* de Java; la pubescence toutefois de même couleur sur le prothorax et les élytres. La femelle a le maximum de la taille indiquée ci-dessus.

Glain-lez-Liége, Décembre 1894.

1) Notes Leyd. Mus. VII, 1885, p. 122.