

NOTE XXXIX.

NOTE SUR UNE ESPÈCE NOUVELLE DE BOSTRYCHUS
(COLEOPTERA: BOSTRYCHIDÆ)

PAR

P. LESNE.

Bostrychus malayanus, nov. spec.

Long. 12—18 mill. — *Bostrycho cænophradoidi* Lesn. ¹⁾
maxime affinis. Differt:

♂ ♀ *pube flavescente scutelli manifesta.*

♂ *fronte minus tenuiter granulata, antice prominentiore;*
costa marginali inferiori declivitatis apicalis lateraliter sinuata.

♀ *spinulis frontalibus minus tenuibus ac minus densis;*
costa frontali prominentiore; pube anterioris marginis pro-
thoracis rutila.

Nous avons d'abord confondu cette forme avec notre *Bostrychus cænophradoides*, dont elle est extrêmement voisine, à tel point qu'on peut la considérer comme une race géographique de ce dernier. Mais les caractères indiqués ci-dessus paraissent très constants. Ils nous ont toujours permis de distinguer les exemplaires malais (*B. malayanus*) de ceux provenant de l'Indo-Chine orientale (*B. cænophradoides*).

Les spécimens assez nombreux de *Bostrychus malayanus* que nous avons examinés, ont été recueillis dans la presque île de Malacca (Muséum de Paris), à Sumatra (Musée de Leyde, Musée de Vienne, Coll. Bedel, Coll. Oberthür) et à Bornéo (Coll. Oberthür).

Paris, Décembre 1898.

1) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, p. 174.