

## NOTE XXXII.

DUAE NOVAE STAPHYLINIDAE EX INDIA  
ORIENTALI (SUMATRA).

DESCRIPTAE AB

## A. FAUVEL.

1. *Xantholinus cicatricosus*, sp. n.

Ad sectionem *fulgidi* referendus, prope *nasutum* Harold (africanum) collocandus. Multo major et robustior. Elongatus, parallelus, nitidissimus, elytris paulo minus, convexus; niger, antennis pedibusque nigro-piceis, palpis tarsisque rufescentibus, elytris rufis, segmentorum 6 et 7 apice rufo-testaceo; capite thoraceque pilis parcis nigrutulis flavisque hirsutulis, elytris abdomineque longius parce flavo pilosis; antennis robustis, capitatis longitudine, circa apicem haud incrassatis, articulis 5 primis glabricalis, nitidis, 1<sup>o</sup> sex sequentes longitudine æquante, arcuato, 2—5 punctatis, 3<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> paulo longiore, 6—10 æqualibus, fortiter transversis, 11<sup>o</sup> breviter conico; capite crasso, convexo, subquadrato, lateribus parallelis, basi truncato, angulis posticis dentatis, inter antennas breviter profunde impresso, medio inter foveas subnasuto, polito, toto profunde sulcatum longitudinaliter cicatricoso, lineis quinque longitudinalibus irregulariter lævibus, altera media, duabus extus disco parma obliquis, duabus aliis post-ocularibus, lateribus crebrius minus grosse, subtus parce punctato; oculis magnis, prominentibus; thorace capitatis longitudine, subtrapezoïdali, convexo, ad angulos anticos rotundatos capitatis latitudine, dein usque ad angulos posticos etiam rotundatos parum angustato, disco antice posticeque utrin-

que parum profunde sulcato, sulcis 4 vel 5-punctatis, margine antico et summo latere cicatricoso, prope angulum anticum fovea impresso, lateribus biseriatim circiter 12-, extus sulculos basales circiter 10-punctato, sulculo subbasali tenuissimo breviter impresso; margine inflexo ante medium carina flexuosa diviso, plaga postica parum punctata; scutello circiter 10-punctulato, triangulariter obtuso; elytris thoracè paulo longioribus, paulo latioribus, disco toto sat dense punctis grossis regulariter, margine inflexo densius minus fortiter, serie intrahumerali magis regulari, spatio ab humeris ad angulum posticum parum elevato, lævi, abdomine vix perspicue cuprino-nigro, utrinque fortiter dense punctato, segmentis dorso medio anguste lævibus, duobus apicalibus paulo minus punctatis. — Long. 20 mill.

Lebong; mense maio. Unicus.

2. *Euryporus argentatus*, sp. n.

Forma *Aleocharæ fuscipedis*, sed triplo major; pube brevi, argenteola supra caput, humeros, scutelli apicem, segmentorum 2 et 6 apicem, corpus subtus fere totum pedesque insigniter vestitus; niger, opacus, abdomine sat nitido; palpis, antennarum articulis 2 primis, tibiis anticis, tarsis, segmento 6º apice 7º que rufescensibus; antennis summo apice dilutioribus, robustis, articulo 1º duabus sequentibus longitudine æquali, 3º 2º paulo longiore, 4º quadrato, 5—10 gradatim paulo latioribus et brevioribus, 7—10 fortiter transversis, 11º vix longiore, oblique truncato; capite parvo, transversim subquadrato, basi profunde sinuato, lateribus post oculos magnos, prosilientes, parallelis, creberrime rugosule, disco medio vix minus punctato; labri margine antico lævi, nitido; collo angusto, æque ac caput punctato; thorace planiusculo, suborbiculari, capite tertia parte latiore, angulis omnibus maxime rotundis, capite subtilius densiusque rugose punctato, linea longitudinali disco vix perspicue elevata, dense subtiliter.

fusco pubescente; scutello magno, creberrime subtilissime strigosulo-punctato; elytris subquadratis, thorace vix rugosius punctatis, vix longius fusco pubescentibus; abdomine crasso, elytris vix angustiore, fusco longius pubescente, pube argentea segmenti secundi fusco interrupta, toto crebre sat fortiter, segmento 6<sup>o</sup> apice creberrime subtiliter punctato; ♂ segmento 7<sup>o</sup> apice subtus late vix emarginato. — Long. 12 mill.

Moeara Laboe; mense novembri. Unicus ♂.

*Obs.* Collo angusto, capite postice fortiter coarctato, punctura corporis et facie *Euryporo puncticollis* Er. (americano) potius quam speciebus europeis vicinus, licet omnino distinctus et ad sectionem genuinam certe referendus.

Caen, mense Maio 1881.