

NOTE XXVII.

DESCRIPTION D'UNE ESPÈCE NOUVELLE DU
GENRE ATRACTOCERUS

PAR

L. FAIRMAIRE.*Attractocerus luteolus*, n. sp.

Long. 18 millim. — Filiformis, parallelus, pallide flavolutescens; oculis nigris, magnis, antice fere conjunctis; antennis brevibus, infuscatis, articulis 2 primis flaveolis, intus penicillatis, sequentibus latis transversim, apicem versus angustioribus; palpis maxillaribus articulo ultimo paulo obscuriore, subtus crenatulo; prothorace longitudine paulo latiore, antice angustato, margine antico cum angulis rotundato, lateribus leviter arcuatis, margine postico ante angulos paulo sinuato, angulis obtusis, dorso tenuiter transversim coriaceo, ante marginem posticum transversim carinato; elytris incostatis, apice obtuse rotundatis; alis abdomine valde brevioribus, costa et nervis flavidis; abdome nitidiore, apice paulo obscuriore; pedibus tenuibus.

Parait se rapprocher de l'*A. celebensis* Gestro, mais chez ce dernier le corselet présente au milieu une bande brune, qui n'existe pas chez notre individu, et n'offre pas de carène transversale à la base; en outre l'abdomen est rembruni en

dessous et à l'extrémité. Dans notre espèce le dernier article des palpes est à peine obscurci et très-brièvement flabellé.

Hab. Sumatra: Sqeroelangoen (Expédition Scientifique Néerlandaise). — Un seul exemplaire.

Paris, 22 Mai 1882.