

## NOTE XXIX.

NITIDULIDES ET CRYPTOPHAGIDES  
DE L'ASIE ET DES INDES ORIENTALES

PAR

A. GROUVELLE.

## NITIDULIDAE.

*Brachypeplus triangularis*, n. sp.

*Oblongo-subelongatus, apice acuminatus, modice convexus, nitidulus, tenuiter fusco-pubescens, ater; corpore subtus pedibusque piceis, singulo elytro in angulis posticis macula ochracea, triangulari, latera haud attingente ornato. Caput transversissimum, inter antennarum bases subprofunde biimpressum, densissime punctatum; punctis plus minusve confluentibus. Prothorax sat transversus, lateribus antice arcuatus, postice subrectus et subampliatus, disco validius quam capite, basi praecipue ad posticos angulos subvalde subvariolo-seque punctatus; antico margine medio vix arcuatim producto, utrinque subsinuato, anticis angulis rotundatis, posticis subacutis; basi medio truncata, utrinque sinuata. Scutellum suborthogonium. Elytra lateribus arcuata, posticis angulis late rotundata, apice vix oblique truncata, breviora quam simul latiora, disco subdepressa, oblique tenuissimeque punctulato-lineata; intervallis irregulariter bilineato-punctulatis. Conspicua segmenta abdominis subdense punctulata. — Long. 7 mill.*

Oblong, assez allongé, environ trois fois plus long que large dans sa plus grande largeur, acuminé vers le sommet

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXXII.

de l'abdomen, modérément convexe, déprimé sur le disque des élytres, médiocrement couvert par une pubescence sombre et fine; noir profond, chaque élytre marginé sur les angles postérieurs d'une grande tache triangulaire, ochracée, n'atteignant pas les bords latéraux et apicaux; dessous du corps et pattes brun de poix. Dernier article de la massue des antennes plus long et plus étroit que le précédent, terminé par un bouton subconique. Tête environ deux fois plus longue que large, modérément convexe, très densément couverte de petits points plus ou moins confluent, assez fortement biimpressionnée entre les naissances des antennes. Prothorax arrondi-rétréci en avant, s'élargissant très faiblement vers la base, environ une fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que long, couvert sur le disque de points fins et plus forts que ceux de la tête, sur la marge basilaire et principalement sur les angles postérieurs de points plus forts, subvarioleux; bord antérieur subsaillant en avant dans le milieu, à peine subsinué de chaque côté; angles antérieurs arrondis; côtés arqués en avant, puis droits, très brièvement sinués contre les angles postérieurs, bordés par un fin bourrelet qui s'étend jusqu'à la marge antérieure et par une gouttière très étroite en avant, devenant vers les angles postérieurs presque une large impression; angles postérieurs subaigus; base subtronquée au milieu, sinuée de chaque côté, étroitement rebordée. Écusson subrectangulaire. Elytres subarqués sur les côtés, largement arrondis aux angles postérieurs, subobliquement tronqués au sommet, très nettement moins longs que larges ensemble, très finement pointillés en lignes légèrement obliques par rapport à la suture, substriés; lignes ponctuées s'effaçant sur les marges latérales et sur la marge apicale, celle-ci densément pointillée; intervalles présentant sur le disque deux lignes pointillées, irrégulières, se réunissant sur les intervalles externes plus ou moins loin avant le sommet; marges latérales rebordées par un fin bourrelet et par une gouttière assez large; marge apicale finement rebordée. Ponctuation des segments visibles de l'abdomen

fine, presque dense. Bords latéraux du prothorax, vus de dessous, largement subcrénelés.

*Hab.* Sumatra: Palembang (Bouchard). — Collections A. Grouvelle et du Musée de Leide.

Cette espèce est voisine des *Brachypterus latus* et *Loweï* Murr.; elle s'en distingue de suite par sa forme plus allongée, acuminée vers le sommet de l'abdomen, son prothorax nettement transversal et la coloration spéciale de ses élytres.

*Brachypeplus brunneus*, n. sp.

*Elongatus*, *subparallelus*, *subdepressus*, *nitidulus*, *flavo-pubescentis*, *brunneus*; *prothoracis lateribus stricte rufis*; *antennis pedibusque dilute piceis*. *Caput transversum*, *inter antennarum bases bimpressum*, *densissime punctatum*, *punctis plus minusve confluentibus*. *Prothorax transversus*, *antice modice*, *postice vix angustus*, *dense et paulo validius capite punctatus*; *marginé antico subtruncato*, *ad extremitates vix producto*; *angulis anticis rotundatis*; *lateribus antice arcuatis*, *postice subparallelis*, *substricté explanato-marginatis*; *angulis posticis breviter rotundatis*; *basi subarcuata*, *tenuiter strictéque marginata*, *utrinque scutelli vix sinuata*. *Scutellum pentagonale*, *dense punctatum*. *Elytra apicem versus vix ampliata*, *tam elongata quam simul lata*, *lineato-substriata*; *punctis submagnis*; *intervallis juxta externum marginem lineapilosum in longitudinem stratorum instructis*. *Conspicua segmenta abdominis subdense et paulatim paulo subvalidius punctata*. — Long. 4,5—4,8 mill.

Allongé, subparallèle, à peine convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave, couchée, médiocrement serrée sur la tête et le prothorax, couchée et dessinant des lignes sur les élytres; brun de poix, étroitement bordé de roux sur les côtés du prothorax; antennes et pattes plus claires. Dernier article de la massue des antennes nettement plus étroit que le précédent, plus court, terminé en bouton tronconique. Tête plus de deux fois plus large que longue, subdéprimée, très densément couverte de points plus ou

moins confluents, biimpressionnée entre les naissances des antennes. Prothorax rétréci en avant, à peine à la base, arrondi en avant, subparallèle sur la majeure partie de la longueur, environ deux fois plus large dans sa plus grande largeur que long, couvert de points très serrés un peu plus forts que ceux de la tête; bord antérieur subtronqué au milieu, très largement à peine échancré; angles antérieurs arrondis; côtés rebordés-explanés, plus étroitement en avant, plus largement sur les angles postérieurs, ceux-ci brièvement arrondis; base subtronquée, à peine subsinuée de chaque côté de l'écusson, finement et étroitement rebordée. Ecusson pentagonal, densément ponctué. Elytres très légèrement élargis vers le sommet, environ aussi longs que larges ensemble, tronqués ensemble au sommet, largement arrondis aux angles apicaux externes, assez fortement ponctué en lignes, substriés; intervalles larges, avec une ligne de petits points cachée par des poils insérés dans ces points, couchés, orientés longitudinalement. Abdomen subparallèle; dernier segment subacuminé vers le sommet; ponctuation des segments visibles progressivement un peu plus forte et un peu plus écartée sur les segments visibles 1 à 3. Dernier segment abdominal du mâle légèrement arrondi au milieu, subsinué de chaque côté.

*Hab.* Java or.: Passaroean. — Musée de Leide.

*Amystrops bicolor*, n. sp.

*Breviter ovata, convexa, nitidula, parce tenueque griseo-pubescentis, rufo-testacea; elytris, margine apicali stricte excepta, nigro-piceis. Antennae graciles, 3° articulo elongatissimo, clava magis duplo longiora quam latiora, ultimo articulo longiore et haud angustiore praecedente. Caput transversissimum, subdense punctatum, margine antico subtruncato; labro subsinuato. Prothorax antice angustus, dense sed fortius capite punctatus; margine antico subtruncato; lateribus rotundatis, tenuiter marginatis; basi subrecta, ad extremitates retrorsum arcuata, utrinque tenuiter marginata; angulis anticis rotundatis, posticis acutis retrorsum productis. Scutellum*

*magnum, subtriangulare, parce punctulatum. Elytra ovata, in maxima latitudine prothorace vix latiora, ad apicem separatim subtruncata, simul latiora quam longiora, quam prothorace fortius sed minus dense punctata; angulis humeralibus late obtusis, indicatis. Pygidium haud occultum, subtriangulare, dense punctulatum. Caput et prothorax infra subleves; metasternum abdomenque dense punctata.* — Long. 2 mill.

Brièvement ovale, convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence grise, fine, espacée; roux testacé, avec les antennes, les pattes et le dessous de la tête un peu plus clairs; élytres, sauf l'extrême marge apicale, brun de poix, avec un léger reflet rougeâtre. Antennes grêles; 1<sup>er</sup> article large, à peu près aussi long que large; 2<sup>me</sup> plus étroit que le 1<sup>er</sup>, un peu plus long que large; 3<sup>me</sup> plus étroit que le 2<sup>me</sup>, environ trois fois plus long que large; 4<sup>me</sup> un peu plus long que large; 5<sup>me</sup> plus long que le 4<sup>me</sup>; 6<sup>me</sup> et 7<sup>me</sup> subtransversaux; 8<sup>me</sup> plus large, lenticulaire; 9<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> formant une massue oblongue, plus de deux fois plus longue que large, dernier article de la massue aussi large que le précédent, mais plus long. Tête environ trois fois plus large que longue, presque densément ponctuée, vaguement biimpressionnée entre les bases des antennes, rétrécie transversalement en avant des yeux jusqu'à l'insertion des antennes, puis rétrécie et saillante en avant pour former l'épistome, celui-ci subtronqué; labre faiblement sinué. Prothorax en avant de la largeur de la tête, beaucoup plus large à la base, arrondi sur les côtés, presque droit au bord antérieur, très largement échancré à la base, presque trois fois plus large à la base que long, moins densément, mais plus fortement ponctué que la tête; bords latéraux finement rebordés; base presque droite sauf aux extrémités, finement rebordée sauf dans le milieu; angles antérieurs arrondis, postérieurs aigus, saillants en arrière. Ecusson occupant presque le tiers de la base du prothorax, subtriangulaire, à peine visiblement alutacé, éparsément ponctué. Elytres ovales, de la largeur du prothorax à la base, ensuite à peine plus larges vers le 1<sup>er</sup> tiers de la

longueur, puis atténués vers l'extrémité, subtronqués séparément au sommet, moins longs que larges ensemble dans la plus grande largeur, plus fortement mais moins densément ponctués que le prothorax; bords latéraux finement rebordés; angles huméraux largement obtus, mais marqués. Pygidium bien découvert, triangulaire, densément et finement ponctué. Dessous de la tête et du prothorax presque lisse; mésosternum et abdomen densément ponctués.

*Hab.* Java: Soekaboemi. — Collection A. Grouvelle.

*Meligethes conjungens*, n. sp.

*Breviter ovatus, convexus, nitidus, tenue cinereo-pubescentis, ater; articulis 2—4 antennarum pedibusque piceis. Caput subdense punctulatum, margine antico sinuato. Prothorax antice angustus, ad basin duplo latior quam longior, subparce punctulatus; margine antico subtruncato; lateribus antice rotundatis, posticis subrectis, divergentibus; angulis posticis acutis. Scutellum transversum, subtriangulare, vix perspicue alutaceum, ad apicem late rotundatum et dense punctulatum. Elytra basi prothorace haud latiora, lateribus vix dilatata, ad apicem attenuata et separatim latissime rotundata, sat dense punctata, transversim strigosa, punctis strigisque ad apicem attenuatis. Tibiae anticae ad basin vix perspicue denticulatae, ad apicem tribus dentibus obliquis armatae: 1<sup>a</sup> dente minima; 2<sup>a</sup> majore; 3<sup>a</sup> magis obliqua et magis lata. Stria marginalis coxarum anticarum ante marginem lateralem arcuata.* — Long. 1,3 mill.

Ovale, environ deux fois plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, brillant, couvert d'une pubescence grise, fine, peu dense; noir, avec les articles 2 à 4 des antennes et les pattes brun de poix. Tête presque densément pointillée; bord antérieur sinué dans le milieu. Prothorax rétréci en avant, deux fois plus large à la base que long, subéparsement pointillé; bord antérieur très faiblement échancré; angles antérieurs arrondis; côtés arqués en dedans en avant, puis subrectilignes et divergents; angles postérieurs aigus, base subarquée, à peine sinuée de

chaque côté de l'écusson. Ecusson transversal, en triangle subtronqué au sommet, à peine visiblement alutacé, densément ponctué au sommet. Elytres de la largeur du prothorax à la base, très brièvement arrondis aux épaules, arrondis sur les côtés mais à peine élargis, atténués vers l'extrémité, très largement arrondis séparément au sommet, presque tronqués, un peu plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur; ponctuation assez forte par rapport à celle du prothorax, assez dense, accompagnée de strigosités transversales; sculpture des élytres atténuée vers le sommet; celui-ci bordé par une fine marge rougeâtre. Pygidium densément ponctué. Marge externe des tibias antérieurs à peine visiblement denticulée à la base, armée à l'extrémité de trois dents obliques: la 1<sup>ère</sup> petite, la 2<sup>me</sup> plus forte, la 3<sup>me</sup> plus large et plus oblique. Strie marginale des hanches postérieures arquée avant l'extrémité.

*Hab.* Yunnan: Yuunnan-sen (R. P. Ducloux). — Collections A. Grouvelle et du Musée de Leide.

*Circopes Kraatzi*, n. sp.

*Ovatus, convexus, nitidus, pube flava et inclinata, in capite prothoraceque et basin elytrorum longiore densioreque vestitus, fulvo-testaceus. Antennae subelongatae; articulis 2°—3° elongatis, subaequalibus, 4°—5° subelongatis, 6°—8° subtransversis; clava oblonga, spissa. Caput transversum, parce punctatum, margine antico subtruncato, pilis pubescentiae lineam marginalem et lineas in longitudinem instructas efficientibus. Prothorax transversus, antice valde angustus, lateribus rotundatus, in disco parce et haud profunde, ad latera fortius punctatus; margine antico late profundeque emarginato, strictissime marginato, lateribus tenuiter marginatis; basi subtruncata, ad extremitates retrorsum subproducta, pilis pubescentiae fere in longitudinem inclinatis, plurimos fasces pilorum convergentium efficientibus. Scutellum transversum, ad apicem truncatum. Elytra ad latera vix dilatata, tam elongata quam simul lata, ad apicem separatim rotundata, parce substrigosulo-punctata; pubescentia ad basin illi prothoracis consimili, in reliquo disco*

*lineato-ordinata*. *Stria metasternalis extremitatem coxae posticae attingens*. — Long. 2 mill.

Oblong, un peu plus de deux fois plus long que large, convexe, brillant, fauve-testacé, couvert d'une pubescence flave, couchée, formée sur la tête, le prothorax et la base des élytres de poils plus longs, un peu plus serrés, presque orientés dans le sens de la longueur, disposés par petits groupes de poils convergents, dessinant des lignes sub-longitudinales irrégulières et encadrant le disque de la tête. Antennes suballongées; 2<sup>me</sup> et 3<sup>me</sup> article allongés, subégaux; 4<sup>me</sup> et 5<sup>me</sup> suballongés; 6<sup>me</sup>—8<sup>me</sup> subtransversaux; massue oblongue, environ une fois et demie aussi longue que large, à peine plus longue que le quart de la longueur totale de l'antenne, compacte; dernier article plus étroit que le précédent. Tête subtriangulaire, presque deux fois plus large au niveau des yeux que longue, éparsément et superficiellement ponctuée, tronquée en avant. Prothorax fortement rétréci en avant; côtés très faiblement convergents à la base, puis presque de suite arrondis en dedans; environ deux fois et un quart plus large à la base que long, fortement échancré au bord antérieur; très finement rebordé sur les côtés; base presque droite, un peu réfléchi en arrière aux extrémités; angles antérieurs, vus de dessus, subobtus, postérieurs aigus; ponctuation éparsée et peu profonde sur le disque, plus marquée sur les côtés. Écusson transversal, subtrapézoïdal, presque lisse. Elytres de la largeur du prothorax à la base, arrondis aux épaules, de suite faiblement atténués vers le sommet, arrondis séparément à l'extrémité, sensiblement aussi longs que larges à la base, éparsément et substrigusement ponctués, à peine visiblement chagrinés; pubescence en dehors de la base un peu plus fine, dessinant des lignes longitudinales. Pattes larges. Poitrine et abdomen couverts d'une pubescence flave, couchée, assez dense. Strie métasternale atteignant l'extrémité de la hanche intermédiaire.

*Hab.* Celebes: Banguay. — Collections du Musée national d'Entomologie de Berlin et A. Grouvelle.

*Circopes Modiglianii*, n. sp.

*Ovatus, convexus, nitidus, pube flava et inclinata vestitus, fulvo-testaceus. Antennae breves; articulis 2—3 elongatis, subaequalibus, 4—5 subquadratis, 6—8 transversis; clava vix elongata, spissa, articulis 2—3 brevissimis. Caput transversum, parce punctatum; margine antico subtruncato; pilis pubescentiae subregulariter dispositis. Prothorax transversus, antice valde angustus, lateribus rotundatus, haud dense punctatus; margine antico late emarginato; lateribus et antici marginis extremitatibus tenuiter marginatis; basi subtruncata, ad extremitates retrorsum subproducta; pilis pubescentiae in longitudinem inclinatis, plurimos fascies pilorum convergentium praecipue ad latera efficientibus. Scutellum transversum, ad apicem subtruncatum. Elytra ad latera vix dilatata, paulo longiora quam simul latiora, ad apicem separatim late rotundata, fere subtruncata, lineato-punctata; punctis ad apicem attenuatis; pilis pubescentiae in lineis punctatis dispositis. Stria metasternalis fere extremitatem coxae posticae attingens. — Long. 2 mill.*

Oblong, un peu plus de deux fois plus long que large, convexe, brillant, fauve-testacé, couvert d'une pubescence jaunâtre, couchée, formée de poils assez fins, longitudinaux ou sublongitudinaux, assez longs sur la tête, le prothorax et les côtés de la base des élytres, peu allongés et dessinant des lignes longitudinales sur la majeure partie de la surface des élytres. Antennes courtes; 2<sup>me</sup> et 3<sup>me</sup> article allongés, subégaux; 4<sup>me</sup> et 5<sup>me</sup> subcarrés; 6<sup>me</sup>—8<sup>me</sup> transversaux; massue oblongue, à peine plus longue que large, moins longue que le quart de la longueur totale de l'antenne, compacte; articles 2 et 3 très transversaux, le dernier à peine plus étroit que le précédent. Tête subtriangulaire, plus de deux fois plus large au niveau des yeux que longue, éparsément ponctuée; épistome tronqué en avant, à peine saillant. Prothorax fortement rétréci en avant, très faiblement convergents sur les côtés à la base, puis presque de suite arrondis en dedans, environ deux fois et un quart plus large à la base que long, fortement échancré au bord

antérieur; très finement rebordé sur les côtés; base presque droite, un peu réfléchie en arrière aux extrémités; angles antérieurs subarrondis, postérieurs aigus; ponctuation fine, peu serrée. Ecusson transversal, subtrapézoïdal, finement pointillé. Elytres de la largeur du prothorax à la base, arrondis aux épaules, de suite faiblement atténués vers le sommet, subarrondis séparément au sommet, presque subtronqués, un peu plus longs que larges à la base, ponctués en lignes; points atténués vers le sommet. Strie métasternale arquée, atteignant presque l'extrémité de la hanche postérieure.

*Hab.* Mentawai: Si-Oban (Modigliani). — Collections du Musée de Gênes, du Musée national d'Entomologie de Berlin et A. Grouvelle.

*Lasiodactylus monticola*, n. sp.

*Breviter oblongus, modice convexus, nitidulus, nigro-piceus, plus minusve fulvo-variegatus, pilis flavis, tenuibus inclinatisque haud dense vestitus. Clava antennarum oblonga. Caput transversum, densissime punctatum, ad antennarum bases utrinque impressum; margine antico subtruncato. Prothorax transversissimus, antice quam postice angustior, lateribus rotundatus, densissime punctulatus, punctis saepius confluentibus; margine antico emarginato; lateribus praecipue ad basin late explanatis; basi vix marginata, utrinque ad extremitates sinuata; angulis anticis late subrotundatis, posticis late obtusis. Scutellum triangulare, parce punctatum. Elytra ovata, circiter  $\frac{1}{3}$  longiora quam simul lata, apice separatim late subacuminata, in longitudinem subcarinata, subdense punctata; punctis circa scutellum confusis, pilis carinarum paulo majoribus, in longitudinem dispositis, marginibus lateralibus late concavo-explanatis. Femora ad basin infuscata; tibiis anticis maris triangularibus, ad apicem haud dilatatis.* — Long. 5 à 6 mill.

Oblong, court, peu convexe, un peu brillant, couvert d'une pubescence flave, couchée, peu serrée, fine, ne masquant pas la couleur du tégument, comprenant sur le prothorax, au milieu des poils ordinaires, quelques poils plus

fins et sur les élytres des poils un peu plus forts, recourbés et inclinés en arrière, disposés en lignes sur les carinules et des poils plus fins disposés en deux lignes sur les intervalles de ces carinules; couleur brun de poix plus ou moins varié de fauve. Antennes modérément longues pour le genre; massue oblongue. Tête transversale, très densément ponctuée, impressionnée de chaque côté vers la naissance des antennes; bord antérieur subsinué, labre peu saillant. Prothorax beaucoup plus rétréci en avant qu'à la base, arrondi sur les côtés, présentant sa plus grande largeur vers le premier quart à partir de la base, plus de trois fois plus large dans sa plus grande largeur que long, très densément couvert de petits points souvent confluent; bord antérieur largement et profondément échancré; marges latérales largement explanées; base très étroitement rebordée de chaque côté, sinuée vers les extrémités; angles antérieurs largement émoussés; postérieurs largement obtus, bien marqués. Écusson transversal, triangulaire, peu densément ponctué. Elytres oblongs, environ une fois et un tiers aussi longs que larges ensemble, brièvement et séparément subacuminés à l'extrémité, subcarinulés dans la longueur; assez densément ponctués; ponctuation confuse autour de l'écusson, disposée en double ligne, un peu irrégulière sur les intervalles des carinules, celles-ci alternativement un peu moins marquées; marges latérales largement explanées, concaves; angles huméraux obtus, marginés. Fémurs enfumés à la base, tibias antérieurs des mâles triangulaires, non dilatés à l'extrémité.

*Hab.* Yunnan (R. P. Ducloux). — Collections A. Grouvelle et du Musée de Leide.

*Pocadius yunnanensis*, n. sp.

*Ovatus, sat latus, convexus, nitidus, sublonge flavo-griseo pubescens, nigro-piceus; antennis, pedibus, bucca, marginibus prothoracis et lata plaga ad basin elytrorum plus minusve extensa fulvis vel fulvo-rufis. Antennae breves, 1° articulo elongato, intus dilatato, 2° elongato, oblongo, 3° minus elongato,*

4° et 5° subquadratis, 6°—8° transversis; clava oblonga, densata, intus magis ampla. Caput valde irregulariterque punctatum, inter bases biimpressum, epistomo inclinato, antice truncato, haud valde punctato; oculis albidis. Prothorax transversissimus, antice angustus, dense, profunde irregulariterque punctatus, antice subtruncatus, lateribus arcuatus, basi medio truncatus, ad extremitates subsinuatis; apice lateribus basique marginatus. Scutellum subtriangulare, ad apicem rotundatum, parce punctulatum. Elytra ad basin prothorace paulo latiora; ad apicem separatim rotundata, in totum tam elongata, quam simul lata, punctato-striata, singulo intervallo uni-punctulato. Pygidium dense punctatum, ad apicem subrugosum. — Long. 3 à 4 mill.

Ovale, un peu plus de une fois et demie aussi long que large, convexe, brillant, couvert d'une pubescence fauve assez longue, couchée sur la tête et le prothorax, dressée sur les intervalles des stries des élytres, dressée, mais plus courte, sur les stries; brun noirâtre; base des antennes, bouche, marges latérales du prothorax, une tache plus ou moins développée à la base des élytres et pattes d'un roux ferrugineux un peu ochracé. Antennes courtes; 1<sup>er</sup> article allongé dilaté, arrondi en dedans; 2<sup>me</sup> oblong, environ une fois et demie aussi long que large; 3<sup>me</sup> moins long que le 2<sup>me</sup>; 4<sup>me</sup> et 5<sup>me</sup> subcarrés; 6<sup>me</sup> à 8<sup>me</sup> transversaux, un peu dilatés en dedans; 9<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> formant une massue oblongue, serrée, environ une fois et demie aussi longue que large, dissymétrique. Tête environ deux fois plus large que longue, densément, fortement, profondément et irrégulièrement ponctué, épistome infléchi, finement ponctué, tronqué en avant; yeux non colorés. Prothorax très rétréci en avant, plus large que la tête, environ trois fois plus large à la base que long, subtronqué en avant, arrondi sur les côtés, surtout en avant, tronqué à la base dans le milieu, subsinué aux extrémités, arrondi aux angles antérieurs, en angle aigu aux angles postérieurs, rebordé sur tout son contour; ponctuation irrégulière, profonde, formée en partie de gros points et en partie de points plus petits. Ecusson

triangulaire, arrondi au sommet, éparsément pointillé. Elytres un peu plus larges à la base que le prothorax, ovales, présentant leur plus grande largeur vers le premier tiers de la longueur, arrondis séparément au sommet, en général sensiblement aussi longs que larges, ponctués-striés; stries plus enfoncées au sommet; sur chaque intervalle une ligne de petits points; épaules en angle obtus, très ouvert. Pygidium densément et subrugueusement ponctué au sommet.

*Hab.* Yunnan (R. P. Ducloux). — Collections A. Grouvelle et du Musée de Leide.

## CRYPTOPHAGIDAE.

*Micrambe Duclouxi*, n. sp.

*Ovata, modice convexa, nitidula, sat dense subflavo-cinereo pubescens, rufo-castanea; antennis pedibusque dilutioribus, marginibus lateralibus prothoracis stricte et in singulo elytro duabus maculis subinfuscatis: 1<sup>a</sup> macula discoidali, elongata, 2<sup>a</sup> ante apicem transversa. Antennae subincrassatae: 1<sup>o</sup> articulo subgloboso; 2<sup>o</sup> paulo longiore quam latiore; 3<sup>o</sup> vix sesquolongiore quam latiore; 5<sup>o</sup> longiore quam vicinis, his subelongatis; 7<sup>o</sup> et 8<sup>o</sup> subquadratis; clava elongata, ad apicem paulatim incrassata, articulis 1—2 transversis. Caput subtriangulare, transversum convexiusculum, dense punctatum; labro minimo. Prothorax transversus, basin versus modice angustus, in longitudinem regulariter convexus, dense, sed paulo minus fortiter quam caput punctatus; margine antico arcuato, ad extremitates subsinuato; angulis anticis breviter poculario-calloso, haud productis; lateribus subparallelis, in medio late subangulosis et ad basin convergentibus et tenuiter denticulatis. Scutellum transversum, suboblongum. Elytra ovata, basi prothorace latiora, humeris rotundata, lateribus arcuata, ad apicem conjunctim rotundata, juxta basin sicut prothorax punctata; punctis ad apicem paulatim attenuatis; stria suturali ultra medium impressa. — Long. 1,8 mill.*

Oblong, environ trois fois aussi long que large dans sa plus grande largeur, modérément convexe, faiblement brillant, couvert d'une pubescence cendrée, faiblement jaunâtre,

couchée, assez dense; brun rougeâtre modérément foncé; pattes et antennes plus claires; bords latéraux du prothorax étroitement rembrunis; sur chaque élytre deux taches subenfumées, mal définies; la 1<sup>ère</sup> discoïdale, allongée, étroite; la 2<sup>me</sup> avant le sommet, transversale, étroite, bien définie à la base. Antennes un peu épaissies; 1<sup>er</sup> article épais, subglobuleux; 2<sup>me</sup> un peu plus long que large; 3<sup>me</sup> à peine une fois et demie aussi long que large; 5<sup>me</sup> plus long que le 4<sup>me</sup> et le 6<sup>me</sup>, ceux-ci faiblement allongés; 7<sup>me</sup> et 8<sup>me</sup> sensiblement aussi longs que larges; 9<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> formant une massue lâche, légèrement épaissie vers l'extrémité, dont les deux premiers articles sont transversaux.

Tête subtriangulaire, environ deux fois plus large au niveau des yeux que longue, subtronquée en avant, un peu convexe, densément ponctuée; pubescence dessinant, par la convergence des poils, une ligne longitudinale sur l'occiput; yeux assez saillants, à facettes moyennes; labre petit. Prothorax régulièrement convexe dans la longueur, environ une fois et demie plus large dans sa plus grande largeur que la tête avec les yeux, modérément rétréci à la base, environ deux fois aussi large dans sa plus grande largeur que long; bord antérieur arqué, subsinué aux extrémités; angles antérieurs tronqués obliquement, terminés par une section oblongue, subconcave, occupant le cinquième de la longueur totale du côté, continuant la courbure du bord antérieur et ne formant en arrière aucune saillie; côtés finement rebordés, d'abord subparallèles, puis subanguleux, convergents et finement denticulés; angles postérieurs obtus; base faiblement arquée, bordée par une strie coupée au milieu par une courte carène longitudinale; marges latérales très légèrement relevées, présentant une impression en face de la partie subanguleuse, couvertes de poils un peu plus épais et plus serrés; pubescence formant par la convergence des poils une ligne longitudinale sur le disque et deux lignes latérales moins bien définies. Écusson suboblong, transversal, moins de deux fois plus large que long. Elytres longitudinalement subdéprimés à la base jusqu'au milieu de

la longueur, arrondis aux épaules, alors un peu plus larges ensemble que le prothorax dans sa plus grande largeur, arrondis sur les côtés, présentant leur plus grande largeur vers le deuxième cinquième de la longueur, arrondis ensemble au sommet, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur; ponctuation contre la base semblable à celle du prothorax, s'atténuant ensuite vers le sommet; strie suturale marquée dans la moitié apicale; pubescence formée de poils courts, un peu plus épais que ceux du disque du prothorax, en général orientés dans la longueur, mais devenant plus longs et orientés obliquement vers l'extrémité de la suture. Femelle hétéromère.

*Hab.* Yunnan: Yunnan-sen (R. P. Ducloux). — Collection A. Grouvelle.

*Micrambe sinensis*, n. sp.

*Oblongus, modice convexus, nitidus, fulvo-testaceus, in elytris nigro maculatus, pube flavo-cinerea sparsa et pilis longioribus intermixtis vestitus. Antennae subincrassatae; 1° articulo subquadrato; 2° subelongato; 3° sesquilongiore quam latiore, 4°, 6°, 7° et 8° subaequalibus, subquadratis, 9° longiore, clava elongata, articulis 1° et 2° transversis. Caput transversum, modice convexum, dense punctatum. Prothorax parallelum, ante basin convergens, densissime punctatus; angulis anticis breviter poculario-callosis, vix perspicue dentatis, lateribus denticulatis, marginatis, breviter explanatis; basi marginata, utrinque punctata. Scutellum transversum, subpentagonale. Elytra post medium subdilatata, ad basin parcius fortiusque capite punctata; punctis ad apicem attenuatis; in singulo elythro macula transversa, elongata, suturam non attingente. — Long. 1,3 mill.*

Oblong, environ trois fois aussi long que large, modérément convexe, roux-testacé sur la tête et le prothorax, testacé avec une tache noire sur les élytres, couvert d'une pubescence flave-cendrée double, comprenant des petits poils peu serrés et des poils plus longs presque disposés en lignes sur les élytres. Antennes un peu épaissies; 1<sup>er</sup> ar-

ticle épais, subcarré; 2<sup>me</sup> un peu épais, un peu plus long que large; 3<sup>me</sup> une fois et demie aussi long que large; 4<sup>me</sup>, 6<sup>me</sup> et 7<sup>me</sup> subégaux, à peine plus longs que larges; 5<sup>me</sup> un peu plus long; 9<sup>me</sup> à 11<sup>me</sup> formant une massue dont les deux premiers articles sont transversaux. Tête environ deux fois plus large que longue, très densément ponctuée. Prothorax subdéprimé sur le disque, à peine rétréci à la base, un peu moins de deux fois aussi large que long, couvert d'une ponctuation très dense, sensiblement aussi forte que celle de la tête; angles antérieurs tronqués, terminés par une section oblongue, subconcave, rebordée, occupant environ le sixième de la longueur totale du côté et à peine saillante; côtés denticulés, d'abord parallèles, puis devenant convergents en avant des angles postérieurs, base rebordée par une forte strie présentant un point enfoncé de chaque côté. Ecusson transversal, subpentagonal. Élytres longitudinalement déprimés à la base, plus larges à la base que le prothorax, ovales, un peu plus de deux fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur; couverts dans la partie basilaire d'une ponctuation beaucoup plus forte et plus espacée que celle du prothorax; ponctuation s'atténuant vers le sommet; sur chaque élytre une tache transversale placée un peu avant le milieu, n'atteignant pas la suture, fortement allongée contre le bord externe. Tarses postérieurs de la femelle de 4 articles.

*Hab.* Chine: Tien-Tsin (Raffray). — Collection A. Grouvelle.

La tache noire des élytres peut se diviser en deux taches longitudinales, l'interne transversale au bord apical, oblique au bord basilaire, la seconde allongée le long du bord latéral; la callosité des angles antérieurs du prothorax varie sensiblement de longueur d'un exemplaire à l'autre. Le *M. sinensis* diffère du *M. micramboides* Reitt. (Verhandl. zool.-bot. Gesellsch. Wien, XXIV (1874), p. 381) par la callosité des angles antérieurs du prothorax peu saillante, par sa pubescence double et sa ponctuation éparse.

Paris, Novembre 1910.