

NOTE XXI.

COLÉOPTÈRES PHYTOPHAGES NOUVEAUX
DE L'AFRIQUE TROPICALE.

DÉCRITS PAR

Ed. LEFÈVRE,

Ancien Président de la Société entomologique de France.

Clytridæ.*Gynandrophthalma decora*, spec. nov.

Oblonga, parum convexa, subtus cum capite, scutello femoribusque viridi-aenea vel nigro-cyanea, tenuiter albido-pubescentibus, labro, palpis, antennis basi, tibiis totis, thorace elytrisque laete fulvis, illo transverso, laevissimo, his confertim punctulatis, singulo maculis duabus (altera ante medium rotundata, altera ultra medium subquadrata, intus arcuata) punctoque humerali magno, virescentibus aut cyanescentibus, tarsis fuscis. — Long. $4\frac{3}{4}$ —5 mm.; lat. 3 mm.

Benguela (Veth et van der Kellen); Mossamedes (Sala).

Gynandrophthalma Woerdeni, Ritsema (Tijdschr. v. Entom. XVIII (1875), p. 138) = *Gynandrophthalma atripennis*, Lacordaire, var. A (Monographie des Phytophages. II (1848), p. 270).

Eumolpidæ.*Colasposoma æmulum*, spec. nov.

Breviter suboblongo-ovatum, modice convexum, viridi-

Notes from the Leyden Museum, Vol. VIII.

metallicum, interdum subaurato-micans, nitidum, labro sicut et palpis nigro-piceis, antennis nigris, articulis basalibus viridi-aeneo-tinctis; capite grosse disperse punctato, inter oculos punctato-rugoso, vertice ad latera utrinque strigoso; prothorace crebre sat fortiter punctato, punctis aciculatis; scutello laevi, apice subrotundato; elytris confertim punctatis, punctis majoribus et minoribus intermixtis, disco exteriori (praesertim infra humeros) obsolete rugulosis, callo humerali ipso subtumido, laevi; pedibus metallico-vel aeneo-viridibus, tibiis apice summo tarsisque piceo-nigris. — Long. 7—7½ mm.; lat. 4—4½ mm.

Var β . Omnino cum pedibus nigro-cyaneum, antennarum articulis basalibus cyaneis.

Niams-Niams (Schlüter).

Voisin du *C. Fairmairei* E. Lef.; en diffère par la forme plus courte et par la ponctuation du prothorax et des élytres.

Nerissus hispidulus, spec. nov.

Oblongus, modice convexus, subtus subcyaneo-niger, pube grisea parce vestitus, supra saturate viridi-aeneus vel obscure cupreus, pilis erectis albidis et fulvis intermixtis dense obtectus, labro brunneo vel nigro-piceo, palpis antennisque nigris; capite sicut et prothorace sat fortiter punctatis; elytris creberrime inordinatim punctatis, punctis confluentibus, strigas transversas undique formantibus; pedibus nigris, femoribus magis minusve aeneo-vel cyaneo-tinctis. — Long. 6—8½ mm.; lat. 3—4½ mm.

Niams-Niams (Schlüter).

Dicolectes rugulosus, spec. nov.¹⁾

Oblongo-elongatus, subparallelus, modice convexus, subtus niger, pube subaurea brevi densissime obtectus, supra viridi-aeneus, nitidus; labro, palpis antennisque basi rufo-

1) Voir pour la description du genre et pour celle de deux autres espèces (*D. aulicus* E. Lef. et *D. erythropus* E. Lef.): Ann. Soc. Ent. France. Bull. (Séance du 14 Avril 1886) p. LX et LXI.

brunneis, harum articulis quinque ultimis murino-sericeis; capite punctato-rugoso; prothorace creberrime foveolatim, sed parum profunde, punctato, foveolis parvis, rotundatis, puncto centrali aciculato instructis; scutello confluentur undique punctato-rugoso; elytris infra basin obsolete transversim impressis, creberrime punctatis, punctis confluentibus, rugas transversas numerosas formantibus, callo humerali ipso subtumido, laevi; pedibus fulvo-brunneis, tarsis piceis. — Long. $7\frac{1}{2}$ mm.; lat. $3\frac{1}{3}$ mm.

Niams-Niams (Schlüter).

Pseudocolaspis setulosa, spec. nov.

Oblonga, aeneo-vel metallico-viridis, interdum aurato-cupreo-micans, nitida, subtus pube argentea sat dense oblecta, labro, palpis, antennis pedibusque rufo-fulvis; capite sicut et prothorace crebre punctatis, argenteo-pubescentibus, hoc subcylindrico, juxta marginem anticum utrinque sat fortiter impresso; scutello subquadrato, apice obtuse truncato, pilis argenteis appressis dense oblecto; elytris thorace multo latioribus, infra basin transversim evidenter impressis, confertim punctatis, infra humeros substrigatis, singulo lineis novem longitudinalibus, e pilis brevibus erectis argenteis formatis, regulariter instructis; femoribus omnibus medio magis minusve virescentibus, subtus dente acuto armatis, tibiis apice extus fortiter angulatim productis. — Long. $2\frac{3}{4}$ —3 mm.; lat. $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{3}$ mm.

Congo (Veth et van der Kellen).

Pseudocolaspis pruinosa, spec. nov.

Suboblonga, viridi-aurata vel aurato-cuprea, fulgida, pube argentea brevi appressa undique oblecta, antennis basi rufis, clava nigra, murino-sericea, labro sicut et palpis nigro-brunneis; capite crebre punctulato; prothorace elongato, a basi ad apicem sensim coarctato, dorso maxime convexo, confertim undique punctato; scutello pentagono; elytris basi thorace multo latioribus, subcuneiformibus, infra basin

obsolete transversim impressis, crebre undique inordinatim punctatis, callo humerali ipso tumido, laevi; pedibus brunneis, femoribus omnibus subtus dente acuto armatis, magis minusve viridi-aureis vel aurato-cupreis. — Long. 3—4 mm.; lat. $1\frac{1}{2}$ —2 mm.

Benguela (Veth et van der Kellen); Congo (van Bemmelen).

Syagrus nigrolimbatus, Ritsema.

Tijdschr. v. Entom. XVIII (1875), p. 140 (sub *Rhyparida*).

Suboblongo-ovatus, subtus nigro-piceus, supra cum pedibus antennisque fulvus, nitidus; capite laevi, epistomate sat crebre punctato, fronte media foveola parva obsolete notata; prothorace laevissimo; elytris fortiter striato-punctatis, punctis versus apicem minoribus, sutura limboque laterali nigris; femoribus omnibus subtus dente acuto armatis. — Long. $3\frac{1}{2}$ mm.; lat. 2 mm.

Loango (van Woerden).

Rhembastus hypomelas, spec. nov.

Suboblongus, modice convexus, subtus niger, supra nigro-aeneus, nitidus, labro, palpis antennisque rufo-fulvis, his apice nigricantibus; capite magis minusve rufescente, punctulato, inter oculus foveola media obsolete instructo; thorace transverso, antice angustato, dorso convexiusculo, sat dense punctato; scutello laevi, apice rotundato; elytris regulariter striato-punctatis, punctis sensim versus apicem minoribus, interstitiis planis, linea punctorum minutissima oculo armato tantum visibili longitudinaliter instructis; pedibus rufo-fulvis, femoribus medio magis minusve aenescentibus, subtus dente minuto armatis. — Long. 3— $3\frac{3}{4}$ mm.; lat. $1\frac{3}{4}$ —2 mm.

Var. β . Capite prothoraceque rufo-fulvis; elytris nigro-subaeneis aut virescentibus, singulo vitta rufo-fulva longitudinali lata, a basi ad apicem extensa et callum humeralem amplectente, ornatis.

Mossamedes (van der Kellen).