

NOTE XII.

CINQ ESPÈCES NOUVELLES D'ÉLATÉRIDES
DE L'ÎLE DE JAVA

DÉCRITES PAR

E. CANDÈZE.

Agraeus Lucasseni, n. sp. ♂.

Rhomboidalis, *brunneo-niger*, *opacus*; *prothorace trapezoido*, *a basi ad apicem gradatim fortiter angustato*, *medio* (♂) *tumido*, *lateribus planatis*, *fulvo-squamulosis*; *elytris gibbosis*, *dorso bituberculatis*, *versus basin squamulis fulvis sparsis*. — Long. $4\frac{1}{2}$ mill., lat. $2\frac{1}{4}$ mill.

Hab. Java: Simpar (rés. Tegal), 3000 pieds d'altitude (Mr. Th. F. Lucassen). — Musée de Leide.

Petite et remarquable espèce dont je n'ai qu'un mâle sous les yeux, et que je dédie à M. Th. F. Lucassen qui l'a découverte. Elle est caractérisée principalement par sa forme régulièrement rhomboïdale qui est due à la forte atténuation antérieure du prothorax, en sorte que l'avant et l'arrière sont également coniques. Le milieu du prothorax forme un relief longitudinal, les côtés sont plats et garnis de poils squamiformes dorés. Les élytres, plus larges que lui et très courtes, sont très fortement bombées, sans stries sinon à la base où elles sont du reste peu marquées avec le 3^e intervalle portant un tubercule oblong.

Agraeus maculosus, n. sp. ♀.

Niger, *subnitidus*, *argenteo-maculosus*, *pilis nigris erectis*

Notes from the Leyden Museum, Vol. XV.

sparsutus; antennis brunneis, acute serratis; prothorace longitudine latiore, lateribus arcuato, dorso convexo, inaequali, canaliculato; elytris prothorace angustioribus, brevibus, a basi angustatis, basi tantum striatis. — Long. 5 mill., lat. 2 mill.

Hab. Java: Kalibakoeng (rés. Tegal), 1000 pieds d'altitude (Mr. Th. F. Lucassen). — Musée de Leide.

Cette espèce est caractérisée par les mouchetures argentées tranchant sur ses téguments très noirs. Je n'en ai vu qu'un specimen que j'estime être une femelle, car il a tout à fait la forme du même sexe du *catulus*, espèce également de Java, dont je possède un mâle et cinq femelles, et qui est encore inédite.

Melanoxanthus tricolor, n. sp.

Niger, parum nitidus, pubescens; antennis nigris; prothorace latitudine haud longiore, convexo, tenuissime punctato, rufo, guttis duabus conjunctis margine antico nigris, elytris a basi sensim attenuatis, punctato-striatis, sutura apice praesertim depressa, plaga laterali abbreviata testacea; subtus, thorace excepto, niger. — Long. 7 mill., lat. $1\frac{1}{2}$ mill.

Hab. Java: Simpar (rés. Tegal), 3000 pieds d'altitude (Mr. Th. F. Lucassen). — Musée de Leide.

Abstraction faite de la tache jaune qui pare les élytres dans leur portion latero-antérieure, cette espèce ressemble beaucoup au *M. nigrosignatus* Cand. (Notes Leyd. Mus. XII, 1890, p. 246), et n'en est peut-être qu'une variété.

Il est bon de noter toutefois que le corselet est un peu plus court et la suture des élytres plus enfoncée.

Melanoxanthus cinnamomeus, n. sp.

Minutus, cinnamomeus, opacus, pubescens; fronte aequaliter convexa, creberrime punctulata; prothorace latitudine haud longiore, creberrime punctis umbilicatis notato, angulis posticis pallidioribus; elytris punctato-striatis, flavescens; subtus pedibusque concoloribus. — Long. $3\frac{1}{2}$ mill., lat. $\frac{4}{5}$ mill.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XV.

Hab. Java: Telaga-bodas (rés. Préanger), cratère près Garoet (Prof. A. A. W. Hubrecht). — Musée de Leide.

L'uniformité de couleur dans un genre où les espèces sont généralement bicolores ou tachetées, rendra celle-ci facilement reconnaissable. J'en dirai autant de la ponctuation du prothorax qui n'est visible qu'avec le secours d'une forte loupe, les points, bien qu'ombiliqués, étant fort peu imprimés.

Je possède aussi cette espèce du Mont Tjikoraï, également dans le Préanger.

Agonischius submetallicus, n. sp.

Angustus, æneus, metallescens, pube fuscescente obductus; antennis obscuris; prothorace latitudine longiore, a basi usque ad apicem gradatim angustato, convexo, crebre punctato, medio canaliculato; elytris prothorace paulo latioribus, ultra medium sensim ampliatis punctato-striatis; abdomine et metathorace passim plus minusve rufescentibus. — Long. 10 mill., lat. 2 mill.

Hab. Java: Simpar (rés. Tegal), 3000 pieds d'altitude (Mr. Th. F. Lucassen). — Musée de Leide.

Fort voisin d'une espèce du Darjeeling, l'*A. metallicus* ¹⁾, dont il a la tournure et la couleur, avec la même tendance du dessous du corps à passer au rougeâtre. Il est toutefois plus petit et proportionnellement plus étroit.

Lorsqu'on regarde sous un jour oblique la pubescence des élytres, on voit que celle des intervalles pairs a un reflet un peu différent de celui des autres, ce qui tient à une inclinaison un peu moindre des poils; cette disposition de la pubescence leur communique un aspect légèrement rayé.

Je possède également cette espèce du Mont Tengger, à l'orient de Java.

Glain-lez-Liége, 4 Novembre 1892.

1) Elatérides nouveaux, fasc. V, dont la publication sera prochaine.