

## NOTE XXXI.

## DREI NEUE ELMIDEN VON SUMATRA.

BESCHRIEBEN VON

EDM. REITTER.

1. *Stenelmis bicolor*, n. sp.

*Elongatus, parallelus, opacus, haud carinatus, niger, elytris fulvo-cinereis, antennis brunneis, tarsis rufis; capite subtilissime ruguloso, prothorace subquadrato, latitudine longiore, subparallelo, ruguloso, in medio longitudinaliter canaliculato, dorso utrinque oblique impresso, angulis omnibus acutis, scutello subrotundato, nigro, elytris thorace vix latioribus, apice acuminatis, aequaliter punctato-striatis, subtus nigro-brunneis.* — Long. 2,8 mm.

Sumatra: Lahat (Moens).

Schwarz, die Flügeldecken gelblich grau. Von der Grösse und Form des *St. consobrinus* Duf., der Halsschild ist aber vorn nicht eingeschnürt, und die Zwischenräume der Punktstreifen auf den Flügeldecken sind alle gleichmässig flach.

Ein einzelnes Exemplar.

2. *Stenelmis pictus*, n. sp.

*Elongatus, antice attenuatus, subtilissime rugulosus, opacus, niger, antennis pedibusque testaceis, prothorace elytrisque flavo-maculatis; capite thorace angustiore, nigro, oculis grandibus; prothorace latitudine vix longiore, antrorsum parum angustato, margine antico flavo, rotundatim producto, dorso quadricostato, costis lateralibus subtilibus sinuatis, costis intermediis ante basin connexis, flavo-maculatis; elytris thorace perparum latioribus, apice subacuminatus, dense punc-*

*tato-striatis, interstitiis alternis magis convexis, tertio antice ante medium elevato, flavo, quinto subcarinato, integro, hoc basi, callo humerali elevato, macula communi in medio, maculis duabus ante apicem (externa antica parvula), et margine laterali cum epipleuris flavis. — Long. 2 mm.*

Sumatra: Soekadana, Lampongs (J. C. van Hasselt).

Mit *St. ceylonicus* Motsch. verwandt, aber doppelt kleiner, die Färbung anders vertheilt.

Ein einzelnes Exemplar.

### 3. *Ancyronyx constrictus*, n. sp.

*Fuscus, subnitidus, glaber, antennis pedibusque testaceis, capite nigro, ruguloso, prothorace latitudine parum longiore, subtiliter granulato, granulis punctiformibus deplanatis, leviter convexo, antrorsum subangustato, ante apicem profunde constricto, dorso utrinque pone medium foveolato; scutello subcordato, elytris thorace latioribus, subparallelis, in medio leviter lateque constrictis, apice obtuse acuminatis, brunneis, dense profundeque punctato-striatis, interstitio tertio elytrorum basi, fasciaque sublaterali piceo-testaceis, interstitio tertio antice ante medium et callo humerali elevatis. — Long. 2,7 mm.*

Sumatra: Medan (W. Dates).

Doppelt grösser als *A. quadriplagiatus* Motsch. von Ceylon; durch die tiefe Einschnürung des Halsschildes vor der Spitze, sowie die abgeschliffene gekörnte Sculptur desselben ausgezeichnet.

Ein einzelnes Exemplar.