

NOTE VIII.

TROIS ÉLATÉRIDES NOUVEAUX DU MUSÉE DE LEYDE

DÉCRITS PAR

le Doct. E. CANDÈZE.

Alaus Keili, n. sp.

Inter majores; niger, eleganter brunneo cinereoque marmoratus; prothorace oblongo-rectangulari, lateribus depresso, margine antico bidentato, angulis posticis divaricatis et carinatis; scutello flavo, declivi; elytris seriatim punctatis, apice late truncatis. — Long. 40 mill., lat. 13 mill.

Hab. Les îles de Sumatra et de Nias.

Sauf la tache oblongue latérale des élytres, assez bien limitée, les teintes brunes foncées, claires et cendrées qui marbrent élégamment le dessus du corps, sont fondues; le prothorax est brun dans sa partie centrale et gris blanchâtre latéralement; les élytres, généralement brunes, sont ornées de taches latérales oblongues d'un brun noir et, en outre, de quelques taches claires, petites, disséminées. J'en ai vu deux exemplaires, l'un communiqué par M. Ritsema et qui provient des récoltes de M. Keil sur le plateau de Liwa (Benkoelen), l'autre, de Nias, que je tiens de M. Staudinger.

Melanozanthus ramusculus, n. sp.

Subopacus, angustus, nigro-fuscus, griseo-pubescens; fronte nigra, fortiter punctata; antennis obscuris; prothorace lati-

Notes from the Leyden Museum, Vol. XX.

tudine longiore, conico, crebre punctato, angulis posticis flavis; elytris profunde punctato-striatis, apice integris, singulatim basi apicemque versus vage flavo-maculatis; pedibus pallidis. — Long. 4 mill., lat. $\frac{3}{4}$ mill.

Hab. L'île de Lombok: Mons Sapit (Fruhstorfer).

Le nombre des petites espèces de ce genre augmente tellement tous les jours qu'il devient nécessaire d'en dresser un tableau dichotomique qui permette, en l'absence de la comparaison avec les types, de parvenir à les nommer sûrement. Les îles Malaises surtout en sont abondamment pourvues et il est peu de collection, faite dans l'une ou l'autre d'entre elles, qui n'en présente de nouvelle.

Melanoxanthus puerulus, n. sp.

Rhomboidali-elongatus, opacus, nigro-brunneus, tenuiter flavo pubescens; fronte fortiter punctata; antennis obscuris, basi flavis; prothorace latitudine parum longiore, conico, crebre punctato, angulis posticis flavis; elytris fortiter punctato-striatis, apice integris, singulatim basi apicemque maculis magnis flavis ornatis; pedibus flavis, femoribus obscuris. — Long. 3 mill., lat. fere 1 mill.

Hab. Les îles de Lutungan et de Lombok: Mons Sapit (Fruhstorfer).

Plus court que le précédent avec lequel il a quelques rapports de coloration, de forme plus rhomboïdale, les taches jaunes des élytres plus grandes et mieux teintées; les cuisses noirâtres. Ces deux espèces sont sujettes à varier, suivant l'oblitération plus ou moins marquée des taches sur les élytres.

Glain-lez-Liége, Février 1898.