

NOTE XXVII.

DESCRIPTION DE DEUX TROGOSITIDES NOUVEAUX.

PAR

A. LÉVEILLÉ.

Temnochila curta, sp. n.

Lata, curta, convexa, fusco-ænea, nitida. Capite alutaceo, utrinque subfoveolato, sat fortiter, sparsim punctato, sulco anteriore integro. Prothorace subquadrato, lateribus basi apiceque rotundatis, angulis anticis vix productis, posticis distinctis, obtusis; dorso alutaceo, sat fortiter punctato, punctis laterum confertis, variolosis, singulis seta præditis. Elytris breviusculis, convexis, basi fortiter elevato-marginatis, striato-punctatis, interstitiis uniseriatim punctulatis. Prosterno fortiter punctato, plus minusve impresso. — Long. 12 mm.; lat. 4 mm.

Hab. Guyane.

Cette espèce est assez voisine de *T. tristis* Muls. (*cribricollis* Reitt.) dont elle se distingue par sa forme ramassée, convexe et par la brièveté des élytres par rapport au prothorax. Son seul aspect globuleux suffit pour la séparer facilement de toutes les autres *Temnochila*.

J'ai vu trois exemplaires de cette espèce: l'une dans la collection du Musée de Leyde, la seconde dans celle du Musée de Paris et la dernière dans la mienne.

Tenebroides Ritsemæ, sp. n.

Elongatus, supra opacus, ater, subtus dilutior, subnitidus, tarsis, antennis palpisque rufescentibus. Fronte plana, ca-

Notes from the Leyden Museum, Vol. XI.

pîte prothoraceque fortiter alutaceis et punctatis. Prothorace subtransverso, postice sat fortiter sinuato-angustato, lateribus a medio ad apicem subparallelis, marginatis, margine punctis subcrenulato, angulis anticis productis, posticis rectis, basi retro arcuata, linea basali vix interrupta. Scutello nitido. Elytris basi ad humeros arcuatis, extus dentatis, medio latioribus, postice leniter attenuatis, alutaceis, valde seriato-punctatis, juxta series angustissime costulatis, costulis nitidis, plus minusve, præsertim a septima interruptis vel catenatis, intervallis vix perspicue punctulatis, margine suturali biserialim punctulato. — Long. 10 mm.; lat. 3,5 mm.

Hab. Colombie (coll. Sédillot), Bogota (v. Lansberge, Mus. de Leyde), deux exemplaires: l'abdomen manque à celui du Musée de Leyde.

Voisin de *T. Bonvouloiri* Lév. mais plus mat, moins transverse et plus atténué en arrière; le prothorax est plus cordiforme, les élytres sont beaucoup moins régulières, surtout à la partie déclive très rugueuse. C'est encore une espèce chez laquelle la marge basilaire du prothorax est presque entière, ce qui enlève à ce caractère de groupe sa valeur absolue.

Je dédie cette espèce à M. C. Ritsema, entomologiste distingué, qui a mis si gracieusement à ma disposition les richesses du Musée de Leyde.