

Een weinig bekende plant, *Vicia tenuifolia* Roth

door

M. T. JANSEN (Veenendaal)

Deze wikkesoort is te vinden nabij de spoorlijn Utrecht—Arnhem tussen Maarsbergen en De Klomp in drie aaneensluitende uurhokken, 32—54, 55 en 56. De spoorlijn zal waarschijnlijk ook de aanvoerlijn zijn geweest, al groeit de plant niet in de spoorbermen zelf, maar een tiental tot enkele honderden meters er vandaan. Vooral in het meest oostelijke hok komt de plant talrijk en op verscheidene plaatsen voor; alle groeiplaatsen hebben als punt van overeenkomst: droge grond, hetzij dijk of hoge wegberm.

Daar de gegevens over deze soort in diverse binnen- en buitenlandse flora's summier en soms ook onjuist zijn, is er reden iets over waarnemingen betreffende deze plant mee te delen, waarbij ook andere dan de in de flora's wel genoemde morfologische verschillen met *Vicia cracca* L. naar voren komen.

In het jeugd stadium valt de plant op door steil rechtopgaande groei van de vrij stevige en harde stengels. Al gauw strengelen de bladranken zich in elkaar; pas aan het eind van de bloei of in de vruchttijd krijgt de samenhangende massa door wind en regenbuien meer de habitus die we kennen van *Vicia cracca*.

Vicia tenuifolia Roth is een nogal vroege bloeier met een korte bloeiperiode. Deze bloei kan op 15 mei beginnen, na 15 juni zal men, ook in een „laat" jaar de plant steeds uitgebloeid aantreffen. De bloei verloopt binnen veertien dagen, wel heel anders dus dan bij *Vicia cracca*. De korte bloei is zeer uitbundig; weinig bloeiende

planten bieden een fraaiër object voor de florist die kleurendia's maakt. In „Hegi” kan men lezen dat in Frankrijk hier en daar de bloeiende planten een sieraad vormen van de randen der akkers met rijpend koren. Hier zal stellig verwisseling met een andere *Vicia*, hetzij *cracca*, of waarschijnlijk *villosa* of *dasycarpa* in het spel zijn. In de zuidoostelijke Kalkvoezen, waar de plant veel voorkomt, troffen we deze begin juli nooit bloeiend aan.

Verder is *Vicia tenuifolia* een overblijvende plant met een zeer lange levensduur, die een compacte begroeiing vormt. In dit opzicht doet hij denken aan *Lathyrus sylvestris* L. Een van de groeiplekken in uurhok 32—56 kennen we sinds 12 jaar; wanneer we de omvang van 1954 en van 1966 vergelijken is aan te nemen dat de plant daar minstens 25 jaar heeft gestaan.

Deze *Vicia* is dus een vast element van de Nederlandse flora geworden en de kwalifikatie „ingeburgerde plant” of „neophyt” voldoet beter dan die van „adventief”.

Summary

Vicia tenuifolia Roth has established itself in the Netherlands since several years. The species is compared with *Vicia cracca* L., of which it differs by a number of well-known morphological characters, and moreover by the fact that its flowering period is very short and rather early, beginning about the middle of May and lasting about 2 weeks; it then flowers abundantly and forms compact masses at the end of its flowering-time and at fruiting time.