

## Korte mededelingen

**Tragopogon hybridus L. adventief in Nederland.** Bij het bewerken van *Tragopogon*-materiaal voor een publikatie over *T. dubius* bleek onder het materiaal van *T. porrifolius* een exemplaar schuil te gaan dat behoort tot de tot dusver niet in Nederland gevonden soort *Tragopogon hybridus* L. Deze Zuideuropese soort heeft evenals *T. porrifolius* paarse lintbloemen en een onder het hoofdje verdikte hoofdjessteel, maar wijkt af door de vruchten van de buitenste bloemen: de stralen van het pappus zijn bij deze vruchten verbreed en missen de lange dunne zijharen. Het exemplaar is gevonden door J. Moerkerk in september 1954 in de duinen bij Noordwijk.

Leiden

R. van der Meijden

**Een nieuw kenmerk van *Alchemilla gracilis* Opiz.** Naar aanleiding van mijn artikel 'Het geslacht *Alchemilla* in Nederland' (*Gorteria* 11, 1983, p. 154) maakt dr. E. Foester (Kleve, West-Duitsland) mij attent op een kenmerk van *A. gracilis*, dat wordt vermeld door Lippert & Merxmüller (*Ber. Bayer. Bot. Ges.* 46, 1975, p. 5).

Volgens deze auteurs zijn bij *A. gracilis* de nerven aan de onderzijde van de wortelbladen voor het grootste gedeelte aanliggend behaard, dit in tegenstelling tot enkele andere *Alchemilla*-soorten, waaronder *A. acutiloba*, waarbij deze nerven – in ieder geval de onderste gedeelten ervan – afstaand behaard of kaal zouden zijn. Gezien de moeilijkheden in een aantal gevallen om *A. gracilis* van *A. acutiloba* te onderscheiden, lijkt het mij gewenst de aandacht te vestigen op dit kenmerk, dat goed voldoet.

Adelaide, Australië

T.W. Jaspars-Schrader