

Korte mededelingen

Meer vondsten van *Nartheicum ossifragum* (L.). Huds. in de duinen? De heer J. M. Gleichman (Wageningen) wijst mij er op, dat de twijfelachtige vondst van *Nartheicum ossifragum* in de duinen van „Zandpoort bij Haarlem”, waarover een Korte mededeling werd opgenomen in *Gorteria* 8, no. 4, p. 73, niet de enige melding is van een vondst van deze soort in het duingebied. HOLKEMA (1870) vermeldt de soort van Ameland op grond van een opgave uit 1856 van KROS in het Ned. Kruidk. Archief, zij het met de voetnoot op pag. 260... „werd na Dr. S. P. Kros door *niemand* (cursief Holkema) op Ameland weer gevonden”. Het cursief van Holkema doet m.i. zijn twijfel aan de juistheid van de opgave goed uitkomen.

Overigens is er nog een andere melding uit het kustgebied bekend, nl. van HEUKELS in zijn in *De Levende Natuur* (1902) gepubliceerde „Tot dusverre bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familiën behorende planten” en wel van . . . Haarlem. Deze opgave, die verder nergens in de literatuur is terug te vinden en die van Kros zijn m.i. weinig overtuigend, zodat bij het voorkomen van *Nartheicum ossifragum* in onze duinen nog steeds een groot vraagteken moet worden geplaatst.

Leiden

J. MENNEMA

Is *Bromus inermis* Leyss. in Twente aan het inburgeren? Sinds ongeveer tien jaar kom ik in Twente de Kweekdravik (*Bromus inermis*) steeds regelmatig tegen. Op de volgende plaatsen heeft hij zich gevestigd:

- a. bij Lonneker, aan de Oude Deventerweg, in houtwal (IVON-hok 28.58.44);
- b. op enige plekken aan de weg Enschede-Deurningen (Weerseloseweg, Vliegveldweg) op al dan niet beschaduwde plaatsen op de berm (28.58.21, 52);
- c. aan de weg Oldenzaal-De Lutte, op beschaduwde berm (29.41.32), hier echter ten gevolge van wegverbreding verdwenen;
- d. in Hengelo aan de zuidhelling van de spoordijk bij de Parallelweg S.S. (28.57.52);
- e. nabij Borne, bij de weg naar Hengelo, op sloottalud langs akkerrand (28.56.15);
- f. tussen St. Isidorushoeve en Rietmolen, op wegberm (34.35.14).

In de Achterhoek vond ik de soort langs de weg Lochem-Diepenheim. Op de meeste der genoemde plaatsen groeit *B. inermis* troepsgewijs (faciësvormend) en houdt goed stand. De vegetaties waarin hij optreedt zijn in het algemeen tot het *Aegopodium podagrariae* te rekenen. Begeleiders zijn b.v. *Aegopodium podagraria*, *Urtica dioica*, *Elytrigia repens* en *Heracleum sphondylium*.

Leiden

E. J. WEEDA