

ook nog veel ijler: soms bezaten ze maar met één steriel bloempje. Ook werd een enkele spruit gevonden met op enige cm onder de top het hierboven al genoemde (tweede) 'schutblaadje'. In de oksel daarvan was echter niets van een bloeiwijze te ontdekken.

Op grond van deze waarnemingen lijkt het aannemelijk dat 'forma *bifolius*' geen toevallige afwijking is, maar een vorm van Rode bies die getypeerd wordt door een duidelijk van de hoofdbloei gescheiden nazomerbloei. In de nazomer is deze vorm op het Groene Strand van Terschelling (maar ook op andere vindplaatsen van de Rode bies<sup>9</sup>) bepaald geen zeldzaamheid. Door hun ijle voorkomen en hun weinig opvallende bloeiwijze worden de planten echter gemakkelijk over het hoofd gezien. Het probleem dat de plant met, bijvoorbeeld, Heukels' Flora<sup>2</sup> onmogelijk te determineren is zou eenvoudig kunnen worden opgelost met een opmerking in de determineertabel van de Cyperaceae of met een verwijzing naar het bestaan van de 'paupervorm' bij de beschrijving van de soort.

1. V. Westhoff & M.F. van Oosten. 1991. De plantengroei van de waddeneilanden. Utrecht.
2. R. van der Meijden. 1996. Heukels' Flora van Nederland (ed. 22). Groningen.
3. E. Heimans, H.W. Heinsius & J.P. Thijsse. 1965. Geïllustreerde flora van Nederland (ed. 21). Amsterdam/Antwerpen.
4. E.J. Weeda, R. Westra, Ch. Westra & T. Westra. 1985. Nederlandse oecologische flora 5. Amsterdam.
5. Eén van deze collecties, uit het herbarium van D.T.E. van der Ploeg, die werd verzameld door Rudolphy in augustus 1973, was eveneens afkomstig van het Groene Strand van Terschelling.
6. W.J. Holverda. 2002. Schriftelijke mededeling.
7. Th. J. Reichgelt. 1956. In: Th. Weevers, B.H. Danser & J. Heimans (red.). Flora Neerlandica. Deel I, afl. 4. Amsterdam.
8. 'Roop' is de lokale benaming voor een touw van ca. 10 m waarmee een paard (of geit) vastzit aan een verplaatsbare grondpen (de 'tjesk').
9. A.S. Kers, RWS Meetkundige Dienst; e-mailbericht waarin melding wordt gemaakt van een vondst in 2002 van enkele duizenden exemplaren van de 'forma *bifolius*' op Ameland (Neerlans Reid).

## Van de redactie

Op het kaft van de vorige en komende afleveringen van *Gorteria* deel 30 staan lijntekeningen van weinig bekende plantensoorten: *Calystegia silvatica* (Gestreepte winde) in aflevering 1, *Euphorbia maculata* (Straatwolfsmelk) in aflevering 2, en ditmaal *Platanus orientalis* (Oosterse plataan), een boomsoort die in stedelijk gebied inburgerd. De achterliggende reden hiervoor is, dat er zo meer aandacht komt voor wachtkamerssoorten (zie *Gorteria* 29, 4) en nieuwe standaardlijstsoorten en dat deze gemakkelijker herkend kunnen worden. De manier om dat te bereiken is het presenteren van een duidelijke tekening.