

Korte mededelingen

Een nieuwe vindplaats van *Genista germanica* L. op de Veluwe. Op 2 juni 1980 werden op de Veluwe, bij Elspeet, twee planten van de Duitse brem (*Genista germanica*) gevonden. Zij werden aangetroffen op een brede, met struikheide en varens begroeide strook tussen twee bospercelen, waarin een fietspad ligt, tezamen met *Genista anglica* en *Sarothamnus scoparius*.

Op het door R.W.J.M. van der Ham vervaardigde kaartje in de Atlas van de Nederlandse Flora 1 (MENNEMA c.s., 1980) staan twee groene blokjes aangegeven in dezelfde omgeving als waar bovenvermelde vondst werd gedaan. Het ene blokje betreft een vindplaats ten zuiden van die bij Elspeet (in het Soerense veld), het andere een vindplaats ten noorden daarvan (bij Gortel). De vondst van 2 juni betekent dus niet alleen een nieuwe vondst sinds 1950, maar ook een geheel nieuwe vindplaats voor onze flora van deze soort, die recent alleen nog maar bekend was van de omgeving van Groesbeek.

Literatuur

MENNEMA, J., A. J. QUENÉ-BOTERENBROOD & C.L. PLATE, 1980. Atlas van de Nederlandse Flora 1. Amsterdam.

Vaassen

E. DE BOER

Een nieuwe vindplaats van *Pulegium vulgare* Mill. De zomere excursie van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland werd in 1980 gehouden van 5–12 juli in Noord-Brabant met als standplaats Ravenstein. Tot de meer opvallende soorten, die daar werden waargenomen, behoorden *Carex vulpina*, *Rhynchosinapis cheiranthos* (ADEMA, 1981) en *Pulegium vulgare*. Deze laatste soort werd gevonden aan het Soldatenwiel bij Lith. Een grote populatie van de polei is daar te vinden op de zo goed als kale, modderige, westelijke oever, tezamen met een opvallende vorm van *Polygonum aviculare*. Naar het noorden en het oosten toe is de oever meer begroeid en vindt men naast deze beide soorten *Alisma plantago-aquatica*, *Alopecurus geniculatus*, *Equisetum palustre*, *Glyceria fluitans*, *Gnaphalium uliginosum*, *Lycopus europaeus*, *Myosotis palustris* subsp. *palustris*, *Ranunculus repens* en *Ranunculus sceleratus*.

Het kaartje van mijn hand in de Atlas van de Nederlandse Flora 1 (MENNEMA c.s., 1980) laat zien, dat *P. vulgare* in de periode vóór 1950 in enkele nabijgelegen uurhokken is gevonden. Van het Soldatenwiel echter was de soort niet bekend. Sinds 1950 is de polei in de directe omgeving van Lith niet meer gevonden. Wel iets verderweg bij Orthen ten zuiden en bij Mook (Vogelshoek) ten oosten van de nieuwe vindplaats. Aan het aantal uurhokken na 1950 kan er thans één worden toegevoegd: 45.14.

Over het voorkomen van de polei in 1980 kan worden gezegd, dat deze soort met zekerheid op twee vindplaatsen nog aanwezig is. En wel op de hierboven beschreven vindplaats bij Lith en op de bekende vindplaats in de Ooy bij Millingen.

Literatuur

ADEMA, F., 1981. *Rhynchosinapis cheiranthos* (Vill.) Dandy bij Ravenstein. *Gorteria* 10 (8), p. 133–134.

MENNEMA, J., A. J. QUENÉ-BOTERENBROOD & C. L. PLATE, 1980. Atlas van de Nederlandse Flora 1. Amsterdam.

Leiden

F. ADEMA