

Korte mededelingen

Carex × beckmanniana Figert. In 1974 verzamelde ik deze zeldzame *Carex*-bastaard op vier nieuwe groeiplaatsen in Friesland. *C. × beckmanniana* schijnt dus toch wel regelmatig voor te komen, daar waar de stamouders *C. riparia* en *rostrata* samengroeien. In terreinen waar veel zeggen bijeen groeien kon bovengenoemde bastaard echter gemakkelijk over het hoofd worden gezien en kan men deze op het eerste gezicht verwarren met b.v. *Carex acutiformis*.

In juni 1972 verzamelde ik *C. × beckmanniana* ook in de „Rottige Meente” bij Nijetrijne, gem. Weststellingwerf (uurhok 16.33) – materiaal bevindt zich in mijn herbarium.

De opgave van *C. × beckmanniana* van Beetsterzwaag in *Gorteria* 6 (12), 1973, p. 185 was foutief; het betrof hier bij nader inzien volkomen fertiele exx. van *Carex riparia*.

Gorredijk

F. RUDOLPHY

Ophrys apifera Huds. in Waterland verdwenen. De korte mededeling van de vondst van deze soort in Waterland in 1974 (*Gorteria* 7, no. 11, 1 okt. 1975, p. 182) heeft diverse reacties ontlokt. De heren H. W. E. van Bruggen (Heemskerk) en G. D. Swanenburg de Veye (Alkmaar) berichten mij, dat in juni 1975 alle exemplaren met kluit en al bleken te zijn uitgegraven, waarover in het augustus-nummer van „Orchideeën” reeds mededeling was gedaan. Dit betekent een vroegtijdig einde van een merkwaardige groeiplaats, die gezien de grote recreatiedruk ter plekke toch geen excuus mag zijn voor de onverlaat, die de orchideeën heeft uitgegraven. Jammer, dat het uitgraven van de knolletjes langs het Kinselmeer een nader oecologisch onderzoek aldaar onmogelijk heeft gemaakt. De heer J. Bol (Enschede) brengt mij een soortgelijke vindplaats buiten het Krijt- en Duindistrict in herinnering, waar de bijenorchis omstreeks 1935 is gevonden, nl. de Wildernis te Brouwershaven (Schouwen) en hij wijst op de overeenkomst in het brakke karakter van beide milieus.

Leiden

J. MENNEMA