

Nieuwe wetenschappelijke namen in de 21^e editie van Heukels' Flora van Nederland

Een nieuwe combinatie in *Glyceria* — Zoals door M. Kerguélen in Bull. Soc. Bot. Fr. 125 (1978): 113–120 is uiteengezet, moet de plant die tot dusver als *Glyceria plicata* Fries bekend stond, de (oudere) naam *Glyceria notata* Chevallier krijgen. Beschouwt men *Glyceria declinata* en *G. notata* als ondersoorten van één soort (de argumenten hiervoor zullen over enige tijd in *Gorteria* worden gepubliceerd), dan dient ook *G. declinata* een nieuwe naam te krijgen. Zij heet dan *Glyceria notata* Chevallier subsp. *declinata* (Brébisson) Weeda, **comb. nov.** (basionym: *Glyceria declinata* Brébisson, Fl. Normandie, ed. 3, 1859: 354).

Leiden

E. J. Weeda

Een nieuwe combinatie in *Caltha* — In principe worden subspecifieke taxa met een eigen areaal, die in het verleden vaak als variëteiten werden opgevat, thans als ondersoort gewaardeerd. Dit geldt voor duinvormen als Liggende asperge (*Asparagus officinalis* subsp. *prostratus*) en Duinkruiskruid (*Senecio jacobaea* subsp. *dunensis*, voorheen var. *nudus*) en voor planten van het zoetwatergetijdengebied zoals Glanzende hoornbloem (*Cerastium fontanum* subsp. *glabrescens*). Ook de Spindotterbloem wordt nu als ondersoort beschouwd. Zij krijgt de naam *Caltha palustris* L. subsp. *araneosa* (Steenis) Meijden, **comb. nov.** (basionym: *Caltha palustris* L. var. *araneosa* Steenis, *Gorteria* 5, 1971: 218).

Leiden

R. van der Meijden