

Korte mededelingen

Een vondst van de trilgraszegge (*Carex brizoides* L.) in Drenthe. In 1973 werd, enkele km ten zuiden van Zuidlaren, in een droge sloot langs een bos *Carex brizoides* L. gevonden. De determinatie werd bevestigd door D. Bakker en D. T. E. van der Ploeg. De soort bedekt hier een oppervlak van ca. $3\frac{1}{2} \times 16$ m. Gezien de standplaats (licht beschaduwd, iets voedselrijk) en de grootte van de groeiplaats is het niet aannemelijk dat de soort hier als adventief opgevat moet worden. Het betreft hier de tweede vindplaats in Drenthe van deze zeldzame soort.

Haren, Gr.

HAN DE BOER

Lab. voor Plantenoecologie

De rivierduinzegge (*Carex ligerica* Gay) ook aan de Overijsselse Vecht. Ten noorden van Rheeze (Ov.) werd in augustus 1974 een groeiplaats ontdekt van *Carex ligerica* Gay. D. Bakker controleerde de determinatie aan een verzameld exemplaar. De soort groeit in de berm van een zandweg, niet duidelijk op een rivierduin, maar wel in de nabijheid van de rivier (ca. 1 km verwijderd van een oude meander). *C. ligerica* wordt in de Flora Neerlandica vermeld voor de Maas, de Waal, de Rijn en de IJssel, echter niet voor de Overijsselse Vecht.

Haren, Gr.

HAN DE BOER

Lab. voor Plantenoecologie

• **Crambe maritima L.** nu ook in België gevonden. In 1974 trof Guido Rappé op een pier in de haven van Oostende tussen basaltstenen *Crambe maritima* aan, een soort, die van België nog niet bekend was. De zeekool, waarvan het aantal vindplaatsen in Nederland gedurende de laatste 15 jaar in belangrijke mate is toegenomen, komt in ons land vooral in het Deltagebied voor. Het lijkt derhalve aannemelijk te veronderstellen, dat de plant in België afkomstig zal zijn van Nederlands zaad, temeer daar in 1974 *Crambe maritima* ook voor het eerst in Zeeuws-Vlaanderen is aangetroffen, nl. te Hoofdplaat, ca. 50 km van Oostende verwijderd. Aan de andere kant moet niet uit het oog worden verloren, dat de zeekool zich ook vanuit de Franse of Engelse Kanaalkust kan hebben verspreid, al is het opmerkelijk, dat de eerste Belgische vondst is gedaan na de sterke uitbreiding, die de soort vooral in Z.W.-Nederland heeft ondergaan.

Leiden

J. MENNEMA