

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. in Schoorl

door

Mej. S. M. VAN DER BAAN (Schoorl)

Naar aanleiding van de artikelen over *Gagea lutea*, die onlangs in *Gorteria* zijn verschenen (HILLEGERS, 1969; LONDO, 1969), lijkt het mij goed om officieel vast te leggen dat deze plant ook wordt gevonden in de kom van het dorp Schoorl, in een bosrestantje grenzende aan het Brinklaantje.

In 1901 werd besloten in Schoorl een nieuw raadhuis te bouwen „in een gedeelte bosch naast het bestaande raadhuis” (GOETTSCHE, 1967). Vermoedelijk was dit de eerste aanslag op het bovengenoemde bos. Dit raadhuis van 1901 is inmiddels getransformeerd in een restaurant, annex manege. Daarnaast bevinden zich nog een

cafeteria en een parkeerterrein. Ik schat dat ongeveer een zesde deel van het oorspronkelijke bos is overgebleven. Het restant bestaat voornamelijk uit hoge iepen, de kruidlaag wordt gekarakteriseerd door in het vroege voorjaar eerst enkele exemplaren van *Gagea lutea*, spoedig gevolgd door de bloei van *Ranunculus ficaria* L., die weer wordt gevolgd door *Ornithogalum umbellatum* L. In de zomer overheerst *Urtica dioica* L.

De voorlaatste keer dat ik *Gagea lutea* zag bloeien was in begin april 1964, in enkele exemplaren. Vanwege de schaarse bloei heb ik toen niets verzameld, alleen enkele bladeren, die ik aan Dr. Westhoff heb getoond, die mijn determinatie bevestigde. Daarna heeft bij mijn weten de plant niet meer gebloeid, totdat ik in het voorjaar van 1971 weer enkele bloeiende planten aantrof, waarvan een exemplaar in de collectie van het Rijksherbarium te Leiden is opgenomen. Overigens zal dit terreintje in de toekomst ook wel het lot treffen van zo vele bosjes langs de binnenduinrand, die zijn verdwenen voor huizenbouw en recreatie.

Voorzover mij bekend is, was er op dit punt nooit sprake van een vroegere „stins” of iets wat daarop lijkt, maar het type begroeiing van het terrein, onmiddellijk grenzende aan de steile duinrand, beantwoordt aan de beschrijving van de „Kleebwälder” of het stinsemilieu, volgens het artikel van LONDO (1969). Iets verder, op de grens van Burgemeester Peecklaan en Omloop, is een bosrestant met enkele planten van *Convallaria majalis* L. en tot voor kort ook *Viola odorata* L. *Ornithogalum umbellatum* staat op verscheidene plaatsen, onder heggen, in wegbermen en in het grasland achter de kerk, *Allium vineale* L. is nog algemener. Weggegooide bolletjes uit tuinen, zoals b.v. van *Scilla*-soorten slaan gemakkelijk in het wild op. Bij de zomerbloemen wordt het beeld bepaald door *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., *Aegopodium podagraria* L., *Geranium robertianum* L., *Geum urbanum* L., *Melandrium rubrum* (Weig.) Garcke en dergelijke.

Door de steeds voortgaande bebouwing is dit bostype verbrokkeld tot een serie van grotere en kleinere bosresten, waarin op de duur slechts de meest algemene planten zich zullen handhaven.

Literatuur

- GOETTSCH, R. P. Schoorl, uitg. Gesto n.v., Alkmaar, z.j. (verschenen in 1967).
HILLEGERS, H. P. M., 1969. Zijn *Gagea lutea* (L.) Ker-Gawl. en *Gagea spathacea* (Hayne) Salisb. in N.O.-Nederland als stinseplanten te beschouwen? *Gorteria* 4 (9), p. 161—165.
LONDO, G., 1969. Enige opmerkingen betreffende *Gagea lutea* en het begrip stinseplant. *Gorteria* 4 (11), p. 191—193.

Summary

Gagea lutea is also found in the remains of a wood in the village of Schoorl, N. of Alkmaar (prov. N. Holland), bordering the dunes. The habitat agrees very well with that described by LONDO (1969).