

Nadere gegevens over het voorkomen van *Chenopodium chenopodioides* (L.) Aellen in Nederland

door

S. J. VAN OOSTSTROOM en TH. J. REICHGELT
(Rijksherbarium, Leiden)

Het voorkomen van deze soort in Nederland werd door ons voor het eerst gesignaleerd (onder de naam *C. crassifolium* Hornem.) in Acta Bot. Neerl. 5, 1956, p. 323—324, waar ook een verspreidingskaartje werd gegeven, dat een zestal vindplaatsen vertoont. Aan deze vindplaatsen kunnen nu de volgende worden toegevoegd; het materiaal daarvan werd door de heer Aellen bij zijn bezoek aan het Rijksherbarium in november 1963 ten dele onder *C. rubrum*, ten dele onder *C. urbicum* aangetroffen (fig. 1).

Texel, polder De Kuil bij Den Hoorn, leg. F. Holkema, 23 juni 1868 (NBV); id., De Cocksdoorp, langs de Roggesloot, leg. A. W. Kloos Jr., 21 aug. 1918 (L); Vlieland, Zuiderzeestrandaan, leg. C. M. van der Sande Lacoste, 20 juli 1858 (NBV); Eemnes-buiten, leg. W. C. de Leeuw, 13 sept. 1928 (L); Hoorn, aan de Zuiderzee, leg. A. W. Kloos Jr., 3 aug. 1927 (NBV); West-Knollendam, op opgebaggerde Zaanklei, leg. A. W. Kloos Jr., juli 1914 (L); IJmuiden, leg. J. C. H. de Meijere, aug. 1883 (NBV); Naarden „in coenosis salsis”, leg. C. A. J. A. Oudemans, aug. 1864 (NBV; L); Amsterdam, in aardappelland aan de Overtoom, leg. C. M. van der Sande Lacoste, sept. 1844 (NBV); Sloterweg bij Amsterdam, leg. H. C. van Hall, z.j. (NBV); bij Zijpe (Duiveland), leg. exc. Ned. Botanische Ver., 24 aug. 1894 (NBV).

Het is merkwaardig dat deze soort hier te lande in ruim 20 jaar niet meer werd gevonden. De laatste vondsten dateren van 1928 en 1943, terwijl het merendeel uit de vorige eeuw stamt.



Fig. 1. Vindplaatsen van

(L.) Aellen in Nederland.

Summary

In Acta Botanica Neerlandica 5, 1956, p. 323—324 the authors mentioned for the first time the occurrence of *Chenopodium chenopodioides* (L.) Aellen in the Netherlands from 6 places. During a revision of the Netherlands *Chenopodium*-species P. Aellen (Basel) found material of 10 more hitherto unknown localities.