

### Korte mededelingen

**Equisetum ramosissimum Desf.** Van deze, in ons land alleen van een vijftal plaatsen in het Fluviatiele district aan Rijn, Waal en IJsel bekende soort, werd door mij op 16 sept. 1961 een vrij rijke vindplaats ontdekt te Rhenen, aan de weg naar Elst, waar deze aan de uiterwaarden van de Rijn grenst. R.

**Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex Bailey.** In de bewerking der *Boraginaceae* in Flora Neerlandica IV, 1, 1961, p. 119 werd door ons als auteur van *Pentaglottis sempervirens* onder voorbehoud opgegeven: Tausch ex Boom, 1950. Wij achtten het nl. waarschijnlijk dat niet Boom doch reeds een andere auteur vóór hem de combinatie gebruikt zou hebben. De heer J. Bergmans (Oisterwijk) maakte ons er onlangs opmerkzaam op, dat dit inderdaad het geval was en dat Bailey de naam reeds gebruikte in de tweede druk van zijn *Manual of Cultivated Plants*, die in 1949 verscheen.

Wij dienen dus te schrijven: *Pentaglottis sempervirens* (L.) Tausch ex Bailey, Man. Cult. Pl. ed. 2, 1949, p. 837. v. O. en R.

**Carex curta Good.** Volgens de Flora Neerlandica, I, 3, 1954, p. 129 zou deze soort ontbreken in het Waddendistrict. Intussen werd zij op 29 juni 1961 door de heer J. W. van Vliet Jr. (Rotterdam) gevonden langs een sloot ten N. van de Nieuwe Kooi op Vlieland. v. O. en R.

**Scirpus rufus (Huds.) Schrad.** In de laatste tijd kwam deze soort in ons land alleen nog voor op de Waddeneilanden. De vondsten daarbuiten zijn oud: Kampereiland (1847), Muiderberg (1848) en Urk (1928), en nadien is de plant op deze plaatsen niet meer aangetroffen. De opgave van de Westenschouwense inlagen (1951), vermeld in Flora Neerlandica I, 4, 1956, p. 29, berustte op een verkeerde determinatie; hij had betrekking op *S. planifolius* Grimm. In de loop van 1961 bereikte ons echter van twee zijden het bericht, dat *S. rufus* overvloedig groeit in de Workumerwaard. Zij werd daar op 27 april gevonden door W. Baaijens, G. de Jong en D. T. E. van der Ploeg en op 14 juni door C. G. van Leeuwen. v. O. en R.

**Catapodium marinum (L.) Hubbard.** In aansluiting op het artikel van Westhoff en Van Leeuwen in deze aflevering delen wij mede, dat door A. de Visser in juni 1960 een rijke vindplaats van deze soort werd aangetroffen op Walcheren langs de binnenzijde van de duinen tussen Domburg en Westkapelle. Nadere bijzonderheden over deze vondst zullen door De Visser in een der volgende nummers gegeven worden. v. O. en R.

**Poa nemoralis L.** Naar aanleiding van het bericht in Gorteria 1, 1961, p. 7 ontving de redactie de volgende mededelingen:

*Poa nemoralis* L. groeit ook, sinds lang, talrijk te Winschoten in het park van de Burcht Oudewerf op glaciaal dekzand boven grondmorene op enkele meters diepte, m.i. als rest van de oorspronkelijke begroeiing van leemdobbenland, die een goede bosgrond opleverde.

Oude Pekela.

J. Mart. Duiven.

Op de vraag betreffende *Poa nemoralis* in het eerste nummer van Gorteria kan ik mededelen, dat ik in mijn herbarium materiaal van deze soort heb van Oenkerk, bos Staniastate, 1953; Veenwouden, bosje pastorie, 1955 en Rijs, Rijsterbos, 1960.

Sneek.

D. T. E. van der Ploeg.