

Korte mededeling

Verschillen in vegetatieve kenmerken tussen de Nederlandse *Rhynchospora*-soorten. In de literatuur wordt weinig aandacht geschonken aan de vegetatieve herkenbaarheid van planten met grasachtige bladeren. Bij *Rhynchospora alba* (L.) Vahl en *R. fusca* (L.) Aiton f. ontdekte ik enkele verschillen, die goed bruikbaar zijn om beide soorten te kunnen onderscheiden:

Rhynchospora alba: Plant zodevormend, zeer zelden kruipend, met een zeer korte

wortelstok. Bladen heldergroen, naar de voet witachtig; schede met 5-9 nerven; tongetje uit een krans van ongeveer even lange haren bestaand; schedemonnd aan de zijkant met tot 3 mm lange, rechte, soms teruggeslagen haren; bladschijf met 3-5 tamelijk brede nerven, van boven met verspreide tot 3 mm lange haren en op de nerven met enigszins verspreide, schuin omhooggerichte, korte, witte haren.

Rhynchospora fusca: Plant ver kruipend, met een lange, zelden een zeer korte wortelstok. Bladen bronsgroen, naar de voet lichtbruin of witachtig; bladschede met 9-15 nerven; tongetje uit een krans van vrij korte haren bestaand, de middelste daarvan het kortst; schedemonnd aan de zijkant met tot 2 mm lange, bochtige, zelden teruggeslagen haren; bladschijf met 9-11 nerven, van boven met verspreide, tot 2 mm lange haren en op de nerven met dicht opeenstaande, schuin omhooggerichte, korte, lichtgroene stekeltjes.

Deze verschillen zijn met behulp van een 10-15 keer vergrotende loep goed te zien. De beschrijving van de bladen heeft alleen betrekking op die van de steriele spruiten, die bij de Nederlandse *Rhynchospora*'s aanzienlijk verschillen van de bloeiende:

- Bloeiende of ten minste in aanleg bloeiende spruiten hebben steeds gelede stengels en bladen met een gesloten bladschede, zonder een tongetje of langere haren op de bladschijf.
- Steriele spruiten hebben niet gelede-stengels en bladen met een open schede, een tongetje dat uit haren bestaat en lange haren op de bladschijf.

In Limburgse populaties van *R. alba* en *R. fusca* was de verhouding tussen 'bloeiende' en steriele spruiten ongeveer 1:20-50.

Hasselt

A. Corporaal