

## Nieuws uit de literatuur II

### Boraginaceae

M. Bolliger, 1982. *Die Gattung Pulmonaria in Westeuropa* (215 pag.). Deze grondige studie vermeldt voor Nederland *P. officinalis* en *P. montana*. Bij het door de schrijver geëtiketteerde Leidse materiaal bevond zich ook een collectie van *P. obscura* uit Nederland.

### Chenopodiaceae

E. Garve, 1982. *Die Atriplex-Arten (Chenopodiaceae) der deutschen Nordseeküste*, Tuexenia 2, p. 287-333. *A. prostata* var. *longipes* wordt als afzonderlijke soort opgevat: *A. longipes*.

### Gramineae

M. Kerguélen, 1983. *Les graminées de France au travers de 'Flora Europaea' et de la 'flore' du C.N.R.S.*, Lejeunia 110 (79 pag.). Volgens de auteur moeten onder andere de volgende wetenschappelijke namen veranderd worden: *Lolium* × *hybridum* wordt *L. × boucheanum* Kunth, *Bromus hordeaceus* subsp. *thominei*, *Elymus pycnanthus* wordt *E. athericus* (Link) Kerguélen.

E. Robbrecht, 1982. *Sorghum halepense (L.) Pers. in uitbreiding in Gent en omgeving (Oost-Vlaanderen, België)*, Dumortiera 23, p. 17-22. De soort is daar de laatste jaren vrij algemeen geworden; vergelijk de recente uitbreiding in Zeeland (Gorteria 11, 1983, p. 234).

### Haloragaceae

K. Faegri, 1982. *Et bortglemt fennoscandisk tusenblad (Myriophyllum)-taxon*, Blyttia 40, p. 149-153. De opvatting van Aiken (Bot. J. Linn. Soc. 80, 1980, p. 213) dat naast *Myriophyllum spicatum* een tweede soort, *M. exalbescens*, kan worden onderscheiden, wordt besproken. Faegri accepteert het laatste taxon als ondersoort van *M. spicatum*: subsp. *squamosum* Hartm. f.