

Korte mededelingen

Crambe maritima L. op Voorne. Nadat in het voorjaar van 1967 een groeiplaats verloren ging door werkzaamheden in het Deltagebied bij Hellevoetsluis, werd door J. Konijnendijk (Oostvoorne) één exemplaar van deze soort gevonden bij de boulevard van Oostvoorne.

Rockanje.

C. Sipkes

Blackstonia perfoliata subsp. serotina (Koch) Vollm. op Voorne en Rozenburg in 1967. Door de zeer hoge waterstand is deze plant op Voorne sterk achteruitgegaan. Er bestaat echter hoop op herstel. Op de groeiplaats op Rozenburg ten noorden van het Brielse Meer staan duizenden en nog eens duizenden exemplaren, faciesvormend en zich uitbreidend langs het nieuwe kanaal, samen met *Centaurium pulchellum*.

Rockanje.

C. Sipkes

Zie voor fluctuaties in aantal en groeiplaats van deze soort VAN DER MAAREL & VAN DER MAAREL-VERSLUYS, in *De Levende Natuur* 66(2), 1963, p. 31-32 (Red.).

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. bij Oostvoorne. Nadat door de hoge waterstand de zeer rijke groeiplaats van deze soort bij Oostvoorne verdwenen was, zijn in 1967 daar weer 4 exemplaren teruggekomen en ook op andere plekken ver uiteen zijn drie planten gevonden door assistenten van het Biologisch Station. Deze planten hebben zaad gezet, zodat bij normale waterstand en voortzetting van het beheer — maaien in de lage valleien — er weer een kans is op herstel.

Rockanje.

C. Sipkes