

## K O R T E M E D E E L I N G E N

Trifolium ornithopodioides L. Bij het doorzien van het Nederlandse materiaal van Medicago falcata L. bleek ons, dat zich in het herbarium van de K.N.B.V. onder deze naam een exemplaar bevond van Trifolium ornithopodioides L., gevonden op Terschelling, bij Midsland, verzameld door J. B. Tijn, en door hem opgezonden aan Heukels. Helaas ontbreekt de datum, maar vermoedelijk is de plant in een der eerste decenniën van deze eeuw verzameld. Het zou zeker de moeite waard zijn bij Midsland zorgvuldig te zoeken of deze interessante soort er nu nog voorkomt.

Petroselinum segetum L. Deze soort was tot voor kort alleen bekend van de in 1937 ontdekte vindplaats bij Kadzand in Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. De heer P. Vandevyvere te Brugge had het geluk haar in het voorjaar van 1956 op de dijk van de Zwarte Polder, gemeente Nieuwvliet, te vinden. Op zijn aanwijzingen bezocht de heer A. de Visser in 1957 eveneens deze plek en verzamelde fraai materiaal, dat zich thans in het Rijksherbarium bevindt.

Tragopogon dubius Scop. Het artikelje van Kern over T. dubius in Corr. bl. no. 2, p. 17 bracht A. de Visser te St. Laurens ertoe dit jaar een Tragopogon nader te bekijken, die hem vorig jaar al verdacht voorkwam. Bij dit onderzoek bleek, dat hij werkelijk te doen had met T. dubius. De soort groeide in een 40-tal exemplaren in de duinen ten W. van het afwateringskanaaltje te Nieuwe Sluis, gem. Groede, en werd verzameld op 9 juli 1957.

Brachypodium pinnatum (L.) P.B. werd op 29 juni 1957 door E. E. van der Voo gevonden in het Linschoter Bos. B. pinnatum komt vrij veel voor op kalk-

hellingen in het Krijtdistrict, maar is daarbuiten zeer zeldzaam. Ze was tot nu toe alleen bekend van 2 plaatsen aan de IJssel, n.l. het Zalkerbos en het landgoed de Hassink te Epse, gem. Gorsel, en één plaats aan de Waal, n.l. de Mil-  
lingerwaard.

v.O. en R.