

EEN ADVENTIEFTERREIN IN FRIESLAND

door D. Franke (Eernewoude) en D.T.E. v.d. Ploeg (Sneek)

(ontv. 25 april 1959)

Het adventiefterrein "de Dwinger" tussen Wartena en Eernewoude blijft nog steeds voor nieuwe verrassingen zorgen. In 1958 konden wij het terrein slechts een drietal malen bezoeken; toch werd er weer een aantal nieuwe soorten aangetroffen. Alleen de nieuwe soorten worden hier vermeld; vondsten van 1955, 1956 en 1957 vonden reeds eerder een plaatsje in het Corr.blad (no. 1,4,8).

<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	<i>Mimulus guttatus</i> DC. hybride
<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb.	<i>Aster novae-angliae</i> L.
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	<i>Helianthus laetiflorus</i> Pers.
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	<i>Tagetes patula</i> L.
<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
<i>Lepidium virginicum</i> L.	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.
<i>Lepidium neglectum</i> Thell.	<i>Scorzonera hispanica</i> L.
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	<i>Bromus unioloides</i> H.B.K.
<i>Erysimum perofskianum</i> Fisch. et Mey.	<i>Bromus arvensis</i> L. var. <i>oliganthus</i> Hartm.
<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.	<i>Eragrostis megastachya</i> (Koel.) Link
<i>Tolmiea menziesii</i> (Pursh) Torr. et Gray	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.
<i>Lythrum virgatum</i> L.	<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link
<i>Malva moschata</i> L. ± var. <i>heterophylla</i> Lej. et Court.	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
<i>Abutilon theophrasti</i> Med.	<i>Setaria glauca</i> (L.) P.B.
<i>Tropaeolum majus</i> L.	<i>Zea mays</i> L.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.
<i>Capsicum annuum</i> L.	var. <i>muticum</i> (Hack.) J. et W.

Het aantal soorten en variëteiten in 4 jaar op het terrein aangetroffen bedraagt thans 210; hieronder bevindt zich een aantal verwilderde cultuurplanten.

Aan de heren dr. S. J. van Ooststroom en Th. J. Reichgelt opnieuw onze dank voor determinatie en contrôle.