

K O R T E M E D E D E L I N G E N

Trifolium ornithopodioides L. Deze soort, waarvan de in het Rijksherbarium en in het herb. van de Kon. Ned. Botanische Ver. aanwezige exemplaren dateren van 1878 (tussen Alkmaar en Bergen), 1879 en 1880 (Oostkapelle, Walch.) en 1903 (Vlieland) werd op 19 mei 1957 door A. de Visser teruggevonden in het vroom ten N. van de Vroonweg in de gem. Vrouwenpolder. Walch. v.O. en R.

Linnaea borealis L. Nadat in 1955 deze soort bij Hulshorst (Veluwe) werd gevonden, is nu weer een nieuwe vindplaats ontdekt, ruim 3 km ten N. van Diever (Dr.) door D. J. Rijpkema op 22 april 1957. v.O.

Planten in het bos van "t Huys te Warmont" bij Warmond, Z.H. Om te voorkomen, dat de hieronder genoemde planten door een eventuele vinder als wild of verwilderd zouden worden beschouwd, wijzen wij er op, dat zij in de jaren 1954-1956 door een inwoner van Warmond ter plaatse werden uitgeplant.

Viola reichenbachiana, Hypericum hirsutum, Chrysosplenium oppositifolium, Alchemilla vulgaris, Fragaria vesca, Geum rivale, Potentilla norvegica, Potentilla sterilis, Circaea lutetiana, Geranium phaeum, Geranium sylvaticum, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nemorum, Pulmonaria officinalis, Digitalis ambigua, Veronica montana, Ajuga reptans, Lamium galeobdolon, Lamium maculatum, Satureja vulgaris, Vinca minor, Asperula taurina, Galium cruciata, Adoxa moschatellina, Knautia sylvatica, Campanula persicifolia, Hieracium lachenalii, Mycelis muralis, Polygonatum multiflorum en Brachypodium sylvaticum. v.O.