

CAREX DIVISA HUDS.

door

Th.J. Reichgelt, Leiden.

In verband met het hieraan voorafgaande artikel van de heer Van der Ploeg lijkt het mij niet ondienstig, aan te geven, hoe *Carex divisa* zich van de in ons land voorkomende verwante soorten onderscheidt. Verwarring is alleen mogelijk met een der soorten uit de sectie *Arenariae*, want buiten deze sectie is *C. divisa* de enige soort met meer dan een aartje aan de top van de stengel uit het ondergeslacht *Vignea*, die een ver kruipende wortelstok bezit.

Van alle Nederlandse soorten van genoemde sectie verschilt *C. divisa* - die tot de sectie *Divisae* behoort - doordat alle aartjes aan de voet vrouwelijk en aan de top mannelijk zijn. Bij de Nederlandse *Arenariae* zijn òf alle aartjes aan de voet mannelijk en aan de top vrouwelijk (*C. brizoides*, *C. praecox*, *C. ligerica* en meestal *C. reichenbachii*) òf is een deel der aartjes geheel mannelijk of geheel vrouwelijk (*C. arenaria*, *C. disticha* en soms *C. reichenbachii*).

Het urntje van *C. divisa* is ongevleugeld. Hierdoor onderscheidt *C. divisa* zich van bijna alle bovengenoemde soorten, die een duidelijke vleugelrand vertonen; alleen bij *C. disticha* is het urntje ook ongevleugeld. *C. disticha* is echter direct van *C. divisa* te onderscheiden door de reeds boven vermelde geslachtsverdeling; bovendien bestaat de bloeiwijze bij *C. divisa* uit slechts ca. 3-7 aartjes en wordt ten hoogste ca. $2\frac{1}{2}$ cm lang, terwijl het aantal aartjes bij *C. disticha* gewoonlijk veel groter en de bloeiwijze langer is. Verder is het urntje van *C. divisa* aan de rand geheel glad of aan de randen van de snavel iets ruw, terwijl bij *C. disticha* de randen van het urntje in de bovenste helft duidelijk ruw zijn.